

Errata

Dizertační práce

Str. 43 uprostřed – odstavec „Negativní prediktivní hodnota“

Chybné změní: $NPV = PN / (PN + FN)$

Správné znění: $NPV = SN / (SN + FN)$

Str. 45 nahoře – doplnění citace

Chybné znění: *Vzhledem k vysoké prevalenci OSA mezi diabetiky 2.typu a širokými dopady neléčené OSA doporučuje Mezinárodní diabetologická federace (IDF) provádět v této populaci screening OSA.*

Správné znění: *Vzhledem k vysoké prevalenci OSA mezi diabetiky 2.typu a širokými dopady neléčené OSA doporučuje Mezinárodní diabetologická federace (IDF) provádět v této populaci screening OSA (Shaw et al. 2008).*

SHAW, J E, N M PUNJABI, J P WILDING, K G ALBERTI, P Z ZIMMET a International Diabetes Federation Taskforce on Epidemiology and PREVENTION, 2008. Sleep-disordered breathing and type 2 diabetes: a report from the International Diabetes Federation Taskforce on Epidemiology and Prevention. Diabetes research and clinical practice [online]. 81(1), 2–12. ISSN 1872-8227; 0168-8227. Dostupné z: doi:10.1016/j.diabres.2008.04.025

Str. 52 obrázek 7 – Proces zařazení pacientů s T2DM do studie, vpravo dole

Chybné znění: *21 pacientů vyloučeno pro technicky nedostatečnou kvalitu monitorace (14 pacientů nedostatečný signál o oxymetru, 13 pacientů nedostatečný signál respiračního průtoku z nosní kanyly)*

Správné znění: *27 pacientů vyloučeno pro technicky nedostatečnou kvalitu monitorace (14 pacientů nedostatečný signál z oxymetru, 13 pacientů nedostatečný signál respiračního průtoku z nosní kanyly)*

Autoreferát

str. 14 nahoře

Chybné znění: *Senzitivita Berlínského, STOP a STOP-Bang dotazníku (skóre ≥ 5) pro AHI 15 byla 50,0 %, 48,5 % a 67,8 % resp.*

Správné znění: *Specificita Berlínského, STOP a STOP-Bang dotazníku (skóre ≥ 5) pro AHI $15 \geq 15$ byla 50,0 %, 48,5 % a 67,8 % resp.*