



Obrázek 50 - Nejlepší pohybová terapie – volba „Jiná“ - Lék. (N=78) a Fyzio (N=176), graf znázorňuje počet kolikrát byla daná terapie zmíněna ve volně dopsané možnosti



Legenda zkratk: jiné (další typy terapie, které zvolilo 1 nebo 2 zdravotníci), PNF (Proprioceptivní nervosvalová facilitace), LTV na NFP (Léčebná tělesná výchova na neurofyziologickém podkladě), korekce\* (zahrnuje posturální korekce, ergonomii, školu zad, korekci pohybových stereotypů, svalové dysbalance, stereotyp dechu, držení těla, korekce sedu, stoje, ADL), PIR (postizometrická relaxace), „cvičení zaměřená na motorickou kontrolu“ (zahrnuto např. aktivace hlubokého stabilizačního systému, stabilizace trupu), ACT (Akrální koaktivační terapie), VRL (Vojtova reflexní lokomoce), MDT (McKenzie metoda Mechanické Diagnostiky a Terapie), DNS (Dynamická neuromuskulární stabilizace)

Obrázek 52 - Nejlepší pohybová terapie - Léč. (i více možností najednou), výběr menšího počtu než 3 lékařů/ek je zařazen pod položku jiné



Obrázek 23 - Nejlepší pohybová terapie – Fyzio. (i více možností najednou), výběr menšího počtu než 3 fyzioterapeutů/ek je zařazen pod položku jiné

