

12 PŘÍLOHY

Příloha č. 1 - Kurtzkeho škála

Tabulka 12.1 *Kurtzkeho škála* (Dufek, 2011)

0	normální nález (všechny FS = 0)
1,0	bez disability (jeden FS = 1, ostatní = 0)
1,5	bez disability (dva FS = 1, ostatní = 0)
2,0	minimální disabilita v jednom FS (jeden FS = 2, ostatní FS = 0 nebo 1)
2,5	minimální disabilita ve dvou FS (dva FS = 2, ostatní FS = 0 nebo 1)
3,0	střední disabilita v jednom FS (jeden FS = 3, ostatní FS = 0 nebo 1)
3,5	střední disabilita v jednom FS (jeden FS = 3), lehká disabilita v jednom nebo dvou (FS = 2), ostatní FS = 0–1
4,0	chůze bez opory a bez zastavení ≥ 500 m, obvykle jeden FS = 4, ostatní 0–1, nebo kombinace menších stupňů, přesahující ale definici pro skóre 3,5
4,5	chůze bez opory a bez zastavení ≥ 300 m, obvykle jeden FS = 4 a kombinace nižších, přesahující definici pro skóre 4,0
5,0	chůze bez opory a bez zastavení ≥ 200 m, v obvykle nejméně jeden FS = 5 nebo kombinace nižších, přesahující definici pro skóre 4,5
5,5	chůze bez opory a bez zastavení ≥ 100 m
6,0	jednostranná opora v chůzi, schopen ujít ≥ 100 m s nebo bez zastávky
6,5	oboustranná opora v chůzi, schopen ujít ≥ 20 m s nebo bez zastávky
7,0	neschopen ujít 5 m ani s pomocí, odkázaný na invalidní křeslo, s nímž je schopen se pohybovat sám a stejně jako zvládá transfer na něj a z něj
7,5	odkázaný na invalidní křeslo, potřebuje pomoc s transferem na křeslo a/nebo s ovládním křesla
8,0	odkázaný na lůžko nebo invalidní křeslo, většinu dne mimo lůžko, zvládá některé úkony sebeobsluhy a efektivně používá horní končetiny
8,5	odkázaný na lůžko po většinu dne, některé úkony sebeobsluhy zvládá stejně, jako efektivně používá horní končetiny
9,0	bezmocný pacient, schopen polykat i komunikovat
9,5	zcela bezmocný pacient, neschopen polykat ani komunikovat
10	smrt v důsledku RS

Příloha č. 2 Tabulka Kategorie BMI dle WHO

Tabulka 12.2 *Kategorie BMI dle WHO* (World Health Organization, 2022)

BMI	Nutriční status
Pod 18,5	Podváha
18,5-24,9	Normální váha
25,0-29,9	Nadváha
30,0-34,9	Obezita I. stupně
35,0-39,9	Obezita II. stupně
Nad 40	Obezita III. stupně

Příloha č. 3 Tabulka Složení respondentů dle pohlaví

Tabulka 12.3 *Složení respondentů dle pohlaví*

Pohlaví	Počet odpovědí	Procentuální část
Žena	112	84,2 %
Muž	21	15,8 %

Příloha č. 4 Tabulka Složení respondentů dle věku

Tabulka 12.4 *Složení respondentů dle věku*

Věková kategorie respondentů	Počet odpovědí	Procentuální část
Do 30 let (včetně 30)	21	15,8 %
30-40 let (včetně 40)	40	30,1 %
40-50 let (včetně 50)	40	30,1 %
50-60 let (včetně 60)	22	16,5 %
Nad 60 let	10	7,5 %

Příloha č. 5 Tabulka Délka trvání RS u respondentů v době vyplnění dotazníků

Tabulka 12.5 *Délka trvání RS u respondentů v době vyplnění dotazníku*

Délka trvání RS v době vyplnění dotazníku	Počet odpovědí	Procentuální část
Méně než 1 rok	17	12,8 %
1-5 let (včetně 5)	31	23,3 %
5-10 let (včetně 10)	24	18 %
10-15 let (včetně 15)	27	20,3 %
15-20 let (včetně 20)	16	12,1 %
Nad 20 let	18	13,5 %

Příloha č. 6 Tabulka Rozdělení respondentů do kategorií BMI dle WHO

Tabulka 12.6 *Rozdělení respondentů do kategorií BMI dle WHO*

Kategorie BMI dle WHO	Počet odpovědí	Procentuální část
Podváha	3	2,3 %
Normální váha	76	57,1 %
Nadváha	38	28,6 %
Obezita I. stupně	13	9,8 %
Obezita II. stupně	1	0,8 %
Obezita III. stupně	2	1,5 %

Příloha č. 7 Tabulka Invalidní důchod u respondentů

Tabulka 12.7 *Invalidní důchod u respondentů*

Stav respondenta	Počet odpovědí	Procentuální část
Plný invalidní důchod	19	14,3 %
Částečný invalidní důchod	31	23,3 %
Bez invalidního důchodu	83	62,4 %

Příloha č. 8 Tabulka Potíže s chůzí u respondentů

Tabulka 12.8 *Potíže s chůzí u respondentů*

Potíže s chůzí	Počet odpovědí	Procentuální část
Ne	64	48,1 %
Občas	35	26,3 %
Ano	34	25,6 %