

## **ABSTRAKT**

Bakalářská práce se zabývá těhotenskou ztrátou v prvním trimestru, konkrétně zamlklým těhotenstvím. Cílem této práce je porovnat dopad zvoleného managementu zamlklého těhotenství (chirurgický vs. farmakologický přístup) na psychický stav pacientky. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část.

Teoretická část se věnuje definicím pojmů k tématu těhotenství, procesu oplození, změnám v organismu těhotné ženy, trvání délky těhotenství a poruchám jeho trvání. Následně se práce zabývá zamlklým těhotenstvím, jeho příčinami a možnostmi řešení. Poslední oddíl teoretické části je zaměřen na psychosociální intervence v průběhu potratu.

Praktická část práce je pojatá jako část výzkumná a k jejímu zpracování bylo využito dotazníkové šetření. Výzkum probíhal částečně na Gynekologicko-porodnické klinice 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a to konkrétně na oddělení G3 a všeobecné gynekologické ambulanci. Druhá část respondentek byla k dotazníkovému šetření přivzata přes sociální síť. Cílem praktické práce bylo porovnat vliv zvolené metody managementu těhotenské ztráty (chirurgický vs. farmakologický přístup) na psychiku pacientek. Souhrnem získaných dat a interpretací výsledků výzkumu je kapitola diskuze.

**Klíčová slova:** zamlklé těhotenství, 1. trimestr, ECUI (instrumentální evakuace dutiny děložní), Misoprostol, psychický stav