

Univerzita Karlova

1. lékařská fakulta

Studijní program: doktorský

Studijní obor: adiktologie



UNIVERZITA KARLOVA
1. lékařská fakulta

Mgr. Tomáš Jandáč

Analýza duálních diagnóz v provozu Ambulance dětské a dorostové adiktologie
(*abstrakt v českém jazyce*)

Analysis of dual diagnoses in the Outpatient Service for children and adolescents of the
Department of Addictology
(*abstract in Czech*)

Disertační práce

Školitelka: Mgr. Lenka Št'astná, Ph.D.

Konzultant: doc. MUDr. et PhDr. Kamil Kalina, CSc.

Praha, 2023

Abstrakt

Východiska – Se vznikem nové koncepce Dětské a dorostové adiktologie a Doporučených klinických postupů v adiktologii se objevuje potřeba popisu cílové populace dětí a mladistvých s duálními diagnózami. Přestože je tato problematika dobře popsána v dospělé populaci, u dětské populace je opora v tuzemské odborné literatuře nedostatečná.

Cíle – Cílem studie je zjistit prevalenci duálních diagnóz u pacientů Ambulance dětské a dorostové adiktologie Kliniky adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze. Dalším cílem je zjistit, zda a jaké vztahy existují mezi typem užívané návykové látky či mezi nelátkovou závislostí a dalšími duševními onemocněními. Třetím hlavním cílem je objasnit vztahy mezi demografickými a dalšími údaji poskytovanými rodiči pacientů ambulance a výskytem duální diagnózy u pacientů.

Metody – Základní data byla získána z nemocničního výkaznického systému FONS. Přidružená data byla získána sběrem pomocí strukturovaných anamnestických listů (SAL) vyplňovaných jedním z rodičů při vstupním vyšetření pacientů. Základní data a přidružená data byla spárována do jednoho souboru dat. U základních dat byl výzkumný soubor o velikosti 393 osob, výzkumný soubor vzniklý spárováním dat ze systému FONS a dat z dotazníků SAL byl 157 osob. Data byla analyzována pomocí metod deskriptivní statistiky a pomocí metod korelační analýzy za využití Pearsonova chí kvadrátu, Fishermanova exaktního testu a Mann-Whitneyova U testu.

Výsledky – Prevalence duálních diagnóz u pacientů Ambulance dětské a dorostové ambulance činila 36,1 %. Nejčastější aditologickou poruchou byly poruchy způsobené užíváním kanabinoidů a jiné nutkavé a impulzivní poruchy zastřešující nelátkové závislosti. Nejčastější psychiatrickou komorbiditou byly poruchy z okruhu poruch chování a emocí s typickým nástupem v dětství a dospívání. Nebyl zjištěn žádný signifikantní vztah mezi typem užívané látky nebo nelátkovou závislostí a typem duševního onemocnění. Naopak jsme zjistili některé

Klíčová slova

Adiktologické poruchy, duální diagnózy, pedopsychiatrie, dětská adiktologie