

Abstrakt

Cíle: Tato bakalářská práce se zabývá rizikovými faktory pro vznik dekubitů u poskytovatelů dlouhodobé lůžkové zdravotní péče v České republice. Teoretická část poskytuje přehled informací o dekubitech, hlavních škálách posuzujících míru rizika jejich vzniku a dalších rizikových faktorech. Cílem výzkumu je ověřit souvislost vybraných rizikových faktorů se vznikem dekubitů u pacientů přijatých k hospitalizaci a schopnost škály Nortonové predikovat riziko vzniku dekubitu.

Metodika: Vzorek tvořilo 1954 pacientů, kterým byla péče poskytována ve dvou zdravotnických zařízeních na 209 lůžkách s kódem ošetrovacího dne 00005. Statistické zpracování využilo popisné statistiky, dále proběhlo zpracování za použití vhodných testů dle charakteru dat, výpočet korelací, regrese a multiregresní analýza.

Výsledky: Výzkum prokázal statisticky významný vztah existence dekubitů při příjmu se stupněm rizika dle škály Nortonové, se všemi jejími odděleně posuzovanými součástmi, stupněm soběstačnosti dle indexu Barthelové, nemocemi močové a pohlavní soustavy, úmrtím během hospitalizace a stupněm farmakoterapie bolesti. Dále prokázal statisticky významný vztah dekubitů vzniklých v průběhu hospitalizace se stupněm rizika dle škály Nortonové, se všemi jejími odděleně posuzovanými součástmi, stupněm soběstačnosti dle indexu Barthelové, pohlavím, věkovou skupinou, kouřením, demencí, úmrtím během hospitalizace a délkou hospitalizace. Zároveň byla zjištěna silná pozitivní korelace hodnot škály Nortonové s hodnotami indexu Barthelové.

Závěr: Škála Nortonové se ukázala jako vhodný prediktor rizika vzniku dekubitů, neboť její jednotlivé součásti jsou vhodnými faktory k posouzení rizika.