

## **Abstrakt**

Tato bakalářská práce se zabývá úrovní depresivních projevů u pacientů s idiopatickou poruchou chování v REM spánku (iRBD). Teoretická část detailně představuje iRBD, vysvětluje souvislost této poruchy s neurodegenerativními onemocněními a dále popisuje neuropsychiatrické projevy, jež iRBD často doprovází. V neposlední řadě také prezentuje běžně užívané sebesuzovací škály pro měření úrovně depresivních symptomů, s důrazem na Beckovu sebesuzovací škálu depresivity pro dospělé, druhou revizi (BDI-II), která byla využita jako měřicí nástroj v empirické části této práce.

Cílem empirické části práce je stanovení a zhodnocení úrovně depresivních projevů vyjádřené celkovým skórem BDI-II u skupiny pacientů s iRBD (n = 70) a u kontrolní skupiny zdravých dobrovolníků (n = 70) z Neurologické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze. Dále pak ověření úrovně depresivních projevů na obou subškálách BDI-II, kognitivně-afektivní a somatické subškále.

Výsledky analýz ukázaly, že pacienti s iRBD vykazují signifikantně vyšší celkový skóre BDI-II než zdravé osoby z kontrolní skupiny a dosahují i statisticky významně vyššího průměrného skóru na obou subškálách BDI-II.

**Klíčová slova:** BDI-II, deprese, idiopatická porucha chování v REM spánku, neurodegenerativní onemocnění, poruchy spánku