

Hlavním cílem diplomové práce bylo popsat epidemiologické charakteristiky virové hepatitidy A v České republice, poukázat na případná specifika při zvýšeném výskytu a možnosti a význam prevence tohoto onemocnění. Je komentován snižující se výskyt VHA v České republice s ohniskově zvýšeným výskytem u specifických skupin, především u drogově závislých. Klesající nemocnost v populaci má za následek narůstající procento osob bez ochranných protilátek, a tak jsou výše zmíněné skupiny významným zdrojem nákazy i pro zbytek populace. Na jednotlivých epidemiích VHA ve 2. polovině 20. století je ukázáno, jak důležité je stanovit zákonem či vyhláškou přísné hygienické normy a pravidelné kontroly u potravin a zdrojů pitné vody při předcházení rozsáhlým epidemiím VHA. Zvýšený důraz na prevenci je v práci zdůrazněn i v případě cestování do rizikových zemí. Protože vnímavost k této infekci je všeobecná a specifická léčba neexistuje, jsou preventivní opatření obzvláště důležitá. Zahrnují zvyšování osobní hygieny (např. časté mytí rukou po použití toalety a před jídlem), zdravotní výchovu, zásobování nezávadnou pitnou vodou a potravinami a vytváření odolnosti organismu proti nákaze (tj. imunizaci).