

Erráta:

- str. 22 opravené na: Ionexová chromatografia ... Separácia spočíva v interakcii nabitého analytu s opačne nabitou funkčnou skupinou naviazanou na stacionárnej fáze, ktorá môže mať podľa sily prítomnej kyseliny, resp. zásady charakter tzv. slabého, prípadne silného meniča iónov
- str. 35 opravené na: Výťažnosť ... Prakticky sa hodnotí porovnaním plochy píku analytu po extrakcii z matrice a plochy píku analytu v štandarde
- str. 47 chybné: následu off-line identifikáciu; správne: následnú off-line identifikáciu
- str. 51 chybné: alcohol dehydrogenázy; správne: alkohol dehydrogenázy
- str. 52 chybné: metabolizmus liečiv pomocou CYP50; správne: metabolizmus liečiv pomocou CYP450
- str. 61 chybné: bol podrobený oxidácii; správne: bol podrobený oxidácii
- str. 65 chybné: koelúcie s hydrofilnými balastmi; správne: koelúcie s hydrofilnými balastmi
- str. 76 chybné: UV ligh emitting diode; správne: UV light emitting diode
- str. 84 opravené na: Práca 3 ... Stariat J., Šesták V., Vávrová K., Nobilis M., Kollárová Z., Klimeš J., Kalinowski D. S., Richardson D. R., Kovaříková P. ...