

SOUHRN

Cílem této práce je přispět ke zmapování reálné situace ve výdeji a spotřebě léčivých přípravků s návykovým potenciálem. V průběhu roku 2005 je sledován výdej léků ze skupiny analgetik a benzodiazepinů v lékárně v Semilech. Jsou vybrány nejčastěji předepisované léky z daných skupin, jde o přípravky: Neurol, Frontin (alprazolam), Lexaurin (bromazepam), Stilnox, Hypnogen (zolpidem), Diazepam (diazepam), Dormicum (midazolam), Tramal (tramadol) a Alnagon (kombinované analgetikum: kyselina acetylsalicylová, kofein, fenobarbital a kodein).

V lékárně bylo v roce 2005 vydáno 66050 receptů, sledované léky byly předepsány na celkem 2968 receptech, to je 4,49% z celkového počtu receptů vydaných v průběhu roku. Větší část klientů tvoří ženy (55,4 %), muži 44,6 %. Pacienti jsou nejčastěji ve věku 50-60 let (15,45 %).

Ze skupiny sledovaných léčiv je nejvíce vydávanou látkou alprazolam, léky s alprazolamem jsou vydávány 3x častěji než léky s diazepamem a téměř 2x častěji než léky s bromazepamem. Nejčastěji předepisovaným přípravkem (dle počtu vydaných balení) je Neurol tbl.1 mg, na druhém místě Neurol tbl.0,25 mg, na třetím místě Hypnogen 15tbl., dále Lexaurin tbl.1,5 mg, Stilnox 20tbl., Alnagon tbl., Diazepam tbl.5mg, Frontin tbl.1mg, Diazepam tbl.10 mg, Lexaurin tbl.3mg, Dormicum tbl.7,5 mg a Tramal cps.50 mg.