

Skríning starých ľudí je veľmi dôležitý z hľadiska posúdenia ich sebestačnosti . Značná časť starých ľudí má dosiaľ nepoznané ťažkosti, ktoré by bolo možné počas procesu vyhľadávania zistiť a liečiť . Toto je vo svete dnes všeobecne uznávané, ale spôsob ako to robiť zostáva problémom. Jedným z nich môže byť aj spôsob, ktorý bol prezentovaný v tejto práci. Vyhľadávanie funkčného postihnutia seniora môže byť oveľa efektívnejšie, ako odhaľovanie nepoznaných symptómov. Zanedbaná funkčná schopnosť býva často finančne veľmi náročná . Prezentovanými testami bol zmapovaný funkčný stav geriatrickej populácie na výpovednej vzorke probantov okresu Prešov, ktorá dovoľuje aplikovať tieto výsledky na celú seniorskú populáciu okresu. Pri vykonávaní bežných dermých čirností sa zistila asi u 7.3 % seniorov ľahká, u 3.1 % stredne ťažká a u 4.1 % ťažká porucha s potrebou celodermej starostlivosti. Kognitívnu poruchu ľahkého stupňa vykazovalo 10.1 % probantov, stredne ťažkú 4.7 % a ťažkú 3.8 % pacientov. Depresia ťažkého stupňa bola identifikovaná u 8.9 % probantov, zväčša neidentifikovaných a neliečených. Index telesnej IU110tnosti dopadol priaznivo v porovnaní s populáciou i vyspelých krajín: 67.2 % probantov sa pohybovalo v pásme normy, 19.6 % v pásme obezity a 15.1 % v pásme kachexie. Zlé domáce podmienky u probantov so závažnejšími poruchami bežných denných čirností ( stredný a ťažký stupeň poruchy) boli zistené až v 22 %. Dotazníkové odpovede a výzor probantov umožnili vytvoriť si plastickejší obraz o tejto generácii. 20 % probantov hodnotilo svoj doterajší život negatívne. Prežiť kOlliec svojho života si praje 71 % opýtaných v kruhu svojich blízkych, 17 % v inštitúcii a 12 % je to jedno. 12 % probantov investigátor hodnotil ako apatických, 9 % ako zúfalých. Takéto zmapovanie bolo urobené prvý krát na Slovensku vôbec.