

ERRATA

Titulní strana: Univerzita Karlova

Poděkování: ... by tato práce nevznikla.

Str. 2: ... popisoval jeho příčiny, příznaky, prognózu a léčbu.

Str. 2: ... dobu působení termické noxy a stav a věk pacienta.

Str. 3: Statisticky je 1 % obyvatelstva...

Str. 5: Hmatová Vaterova-Paciniho tělíška jsou nejvíce zastoupena...

Str. 6: Popáleninu klasifikujeme dle hloubky postižení do tří stupňů.

Str. 9: Dalším způsobem k zjišťování možné kolonizace rány je otisková metoda...

Str. 12: ... předejít rozvoji generalizovaného edému.

Str. 12-13: Umírající navzdory terapii (T4) jsou označeni modrou a mrtví černou kartou.

Str. 13: ... když má pacient plochy již částečně zhojeny.

Str. 15: ... by mohly vést k infekci plochy a poškození epitelu.

Str. 23: pneumothorax

Str. 24: osteoatróza

Str. 27: Zakreslení popálených ploch viz Příloha č. 1.

Str. 27: pozn.: větroměr

Str. 28: ... lýtka měkká, prohmatná

Str. 40: ... jizvy vystupují nad niveau

Str. 41: ... přínos nespátroval

Str. 42: ... trvalým tématem zůstává ...; Další stěžejní otázkou v popáleninové medicíně je...

Zkratky

AS akce srdeční

DM úplavice cukrová, „cukrovka“; lat. diabetes mellitus

Hb hemoglobin

PaO₂, pO₂ parciální tlak kyslíku v krvi

pCO₂ parciální tlak oxidu uhličitého v krvi

P/F poměr PaO₂/FiO₂

RA rodinná anamnéza

Příloha č. 3: ... hospitalizace 28. 6. až 6. 8. 2017.

Příloha č. 5: ... děkuji J. Banýrovi, DiS.