

Ve své práci jsem se zaměřila na problematiku ošetřování bércových vředů, Toto onemocnění v posledních letech zaznamenalo nárůst mezi obyvatel a již to není jen onemocnění starší generace, ale stále častěji postihuje i osoby v produktivním věku. Multifokální rizikové faktory jsou hlavní příčinou stále stoupajícího výskytu onemocnění žilního systému dolních končetin a tím i vZIUku chronické žilní insuficience a následného bércového vředu.

M)01 cílem nebylo objevovat novinky, ale připomenout a utřídit již známé informace do přehledného celku. V této práci nabízím stručný přehled příčin vzniku vředového onemocnění a způsobů léčby. Rovněž je podstatné připomenout jednotlivé fáze hojení ran, které se při léčbě musí dodržovat a podporovat, a taktéž zdůraznit ochranu již nově vzniklých tkání před opětovnou traumatizací. Tím se zvýší úspěšnost zhojení vzniklých defektů. Mezioborová spolupráce lékařů (kožní, cévní, chirurgičtí a interní lékaři) umožňuje kvalitnější a efektivnější léčbu na celkovém podkladě. Tím máme na mysli nejenom léčbu rány, ale také celého žilního systému, celkového stavu pacienta a zaměření se při prevenci na eliminaci vyvolávajících faktorů.