

Abstrakt:

Mnohé výzkumy jsou zaměřeny na studium depresivity ve stáří, z jejichž výsledků vyplývá, že negativně ovlivňuje kognici starších osob. Výzkumů, které by se zaměřovaly na geriatrickou úzkost, není takové množství, a navíc přináší protichůdné výsledky. Tato práce si v teoretické části klade za cíl poskytnout náhled na úzkost z filozofického a klinického pojetí, a zejména popsat specifika geriatrické úzkosti a různé oblasti lidského života, které ji mohou ovlivňovat. V praktické části práce jsou prezentovány výsledky 279 účastníků studie NANOK ve věku 60–92 let, přičemž analýza se zaměřuje na vztah úzkostných symptomů ke kognici při zohlednění depresivní symptomatiky. Významné rozdíly jsou u zdravých starších osob nalezeny pouze u testů bezprostředního a oddáleného vybavení z epizodické paměti. U testů pozornosti a exekutivních funkcí nejsou nalezeny významné odlišnosti. Diskutovány jsou různé možnosti ovlivnění kognice úzkostí.

V našem souboru zdravých seniorů nesouvisela míra úzkostné symptomatiky s úrovní kognitivních výkonů.

Klíčová slova: stáří; kognice; deprese; úzkost; screening; Inventář geriatrické úzkosti; GAI