





































Příloha A - Ultrazvukové typy kyčlí

Typ	Kostěný okraj stříšky	Chrupavčitý okraj stříšky	Úhel alfa	Úhel beta
Ia	ostrý	úzká baze, přesahuje ½ hlavice	> 60°	< 55°
Ib	zaoblený	rozšířená baze, přesahuje ½ hlavice	> 60°	> 55°
IIa+	oblý	rozšířená baze, přesahuje ½ hlavice	55–59°	> 55°
IIa-	oblý	rozšířená baze, přesahuje ½ hlavice	50–54°	> 55°
IIb	oblý (od věku 3 měsíců)	rozšířená baze, přesahuje ½ hlavice	50–59°	> 55°
IIc	oblý až kulatý	široká baze, kryje ½ hlavice	43–49°	70–77°
D	oblý až kulatý	evertovaný	43–49°	> 77°
IIIa	plochý	evertovaný	< 43°	> 77°
IIIb	plochý	evertovaný, echogenní	< 43°	> 77°
IV	plochý	výrazná everze	< 43°	> 77°

(FRYDRYCHOVÁ ET AL., 2016)

Příloha B – schéma psychomotorického vývoje

Tabulka 1. Vývojové vyšetření modifikované podle Vlacha a Vojty												
	1 měsíc	2 měsíce	3 měsíce	4 měsíce	5 měsíců	6 měsíců	7 měsíců	8 měsíců	9 měsíců	10 měsíců	11 měsíců	12 měsíců
I. poloha na zádech	 reflexní úchop	úsměv	 brouká	obrací se za zvukem	sahá po hračce		hraje si s nohama vyslovuje slabiky	opakuje slabiky	zdvojuje slabiky		jedno smyslu plné slovo	
II. posazování (trakční test)						 posazeno sedí bez opory			samo se posadí	na výzvu provede pohyb (paci-paci, pá-pá, tik-tak apod.)	shazuje hračky, podá, ev. ukáže asi pět známých předmětů	
III. poloha na břiše						 převrátí se na břicho	 dělá „Jeta-dlo“ (pivotuje)	 udrží se v trakaři	 leze po čtyřech		vyleze na schod	
IV. závěsy závěs pod bříškem (Landau)	hlava: lehce skloněná trup: lehká flexe HK a DK: volná flexe 		šije: sym. extenze až k ramenům trup: sym. extenze až po střední Th HK a DK: volná flexe 		šije: sym. extenze trup: v 6 měs. sym. extenze až k Th-L přechodu DK: v kyčli pravouhlá flexe s lehkou abdukcí 		od 7. měsíce se rozvíjí volná extenze DK					
V. závěsy boční polohy (Vojta)												svrchní HK a DK: volná extenze a abdukce 
VI. závěsy závěs v podpaží				DK: aktivně přitahovány k břichu 			DK: volná axt. s lehkou abdukcí v kyčli 					
VII. vertikalizace	 reflexní stoj			 neudrží váhu těla	 udrží váhu těla			 postaví se samo u nábytku	chodí kolem nábytku úkroky			
VIII. závěsy Collis horizontální	volná HK: objímací fáze jak u Moro DK: volná flexe 		volná HK i DK: volná flexe		pronace volného předloktí, vzpor ruky, DK zůstává ve volné flexi 			volná DK: flexe v kyčli, volná extenze v koleni 				
IX. závěsy Collis vertikální	volná DK: flexe v kyčli koleni dorzální flexe nohy 				volná DK: flexe v kyčli, volná extenze v koleni 							
X. závěsy Peiperbert	HK: objímací fáze jak u Moro, flexe pánve, extenze šije 	HK: upažené ruce: otevřené pánve; flexe 		HK: poloviční vzpažení ruce: otevřené šije a trup: sym. extenze až k Th-L přechodu, flexe pánve povolí 			vzpažení HK s otevřenými rukama, sym. extenze šije a trupu až k LS přechodu 					od 12. měs 
XI. úlekové reakce	Moro I. II. ±	Moro ±	Moro ±	Moro φ								

(CÍBOCHOVÁ, 2004)

