

7 SOUHRN

VÝDEJ VYBRANÝCH LÉČIV S NÁVYKOVÝM POTENCIÁLEM V LÉKÁRNĚ

Mgr. Veronika Viková

V průběhu roku 2006 byl sledován výdej nehrazených potenciálně návykových léčiv v lékárně základního typu ve Vrchlabí. Konkrétně byl sledován výdej Alnagonu, Korylanu, Subutexu a léčiv s obsahem zolpidemu (Stilnox, Hypnogen, Zolpidem-Ratiopharm a Zolsana).

Celkem bylo vydáno 3 637 balení těchto léčivých přípravků. Z toho ženám 61,7 % (2 245 balení) a mužům 38,1 % (1 386 balení).

Z hlediska celkového počtu vydaných balení jednotlivých léčivých přípravků byl nejvydávanějším Alnagon (33,0 %), následován Stilnoxem 20tbl (21,3 %), Stilnoxem 10tbl (12,8 %), Subutexem 8mg (10,8 %), Hypnogenem 15tbl (9,0 %) a Korylanem (4,0 %).

Počet vydaných balení v rámci jednotlivých věkových skupin postupně s věkem narůstal. Největší počet balení vybraných léčivých přípravků bylo vydáno pacientům ve věku od 61 do 70 let (31,4 %) a mezi 51-60 lety (21,4 %).

Nejčastěji vydávaným léčivým přípravkem u pacientů do 30-ti let se stal Subutex 8mg. Stilnox 20tbl se stal nejvydávanějším léčivým přípravkem u pacientů ve věkových kategoriích 31-40 let, 41-50let a 71-80 let. U pacientů ve věku 51-60 let, 61-70 let a 81-90 let byl nejvíce expedován Alnagon. U pacientů nad 91 let se vydalo nejvíce Korylanu.