

ABSTRAKT

Úvod: Nádory orofaryngu jsou jednou z nejčastějších malignit v oblasti hlavy a krku. V minulosti byl jejich výskyt spojován s klasickými rizikovými faktory (kouření a požívání alkoholu). V posledních letech dochází k nárůstu orofaryngeálních karcinomů vzniklých na podkladě infekce HPV (human papilloma virus). Změna etiologie znamená i řadu klinických odlišností, nejzásadnější je významně lepší prognóza přežití u pacientů s HPV+ karcinomy.

Cíl: Hlavním cílem diplomové práce bylo správně charakterizovat pacienty s orofaryngeálními karcinomy a zjistit rozdílná specifika sesterské intenzivní péče o tyto pacienty.

Metodika: Pro práci byla použita metoda kvantitativní prospektivní studie, do které bylo zařazeno 30 pacientů s orofaryngeálním karcinomem po chirurgické léčbě hospitalizovaných na jednotce intenzivní péče. Pacienti byli rozděleni do 3 souborů: HPV+ nekuřáci, HPV+ kuřáci, HPV- kuřáci.

Výsledky: Studie potvrdila demografické rozdíly mezi jednotlivými soubory pacientů. Soubor HPV+ nekuřáků je charakteristický nižším průměrným věkem, to se výrazně projevuje ve zkrácení doby hospitalizace. Dále zde dochází ke snížení podávání opiátů, nižšímu výskytu infekce a pooperačních komplikací a méně častě změně antibiotické léčby. Tito pacienti vykazují také vyšší socioekonomický status a vzdělání, celkově lepší stav a zájem o své zdraví. Další výsledky neprokázaly výrazné rozdíly mezi zkoumanými soubory.

Závěr: Intenzita pooperační ošetrovatelské péče není ovlivněna HPV statusem pacienta, ale vyplývá z faktorů, kterými jsou vyšší věk pacienta, požívání alkoholu a tabáku, přítomnost přidružených onemocnění a celkový stav pacienta.

Doporučení: Výsledky byly prezentovány na Studentské vědecké konferenci a budou využity jako podklad pro vytvoření výukového materiálu, který bude dostupný formou přednášky v e-learningu.

Klíčová slova: Orofaryngeální karcinom, HPV, chirurgická léčba, etiologie, epidemiologie, ošetrovatelská péče