

## **Abstrakt**

Práce se ve své literárně-přehledové části věnuje objasnění mechanismů regulace příjmu potravy, vlivu rodiny na stravovací návyky dětí, stravování dětí ve věku od 2 do 6 let a specifickým stravování dětí s poruchou autistického spektra. Dále je představena metodologie a výsledky realizovaného výzkumu. Rodiče dětí s PAS ( $N = 34$ ) a typicky se vyvíjejících dětí ( $N = 24$ ) ve věku 2-6 let vyplnili sérii dotazníků. Skupiny dětí se mezi sebou lišily v oblíbenosti potravinové kategorie „ovoce“ (méně oblíbená dětmi s PAS,  $M = 3,58$ ,  $SD = 0,9$ ,  $Mdn = 3,86$  vs.  $M = 4,05$ ,  $SD = 0,61$ ,  $Mdn = 4,17$ , Mann Whitney  $U = 236$ ,  $p = 0,046$ ); v množství nikdy neochutnaných potravin (více u dětí s PAS,  $M = 15,2$ ,  $SD = 11,7$ ,  $Mdn = 10,5$  vs.  $M = 5,6$ ,  $SD = 6,4$ ,  $Mdn = 4,0$ ,  $U = 134$ ,  $p < 0,001$ ); a v četnosti emočního přejídání (častější u dětí s PAS,  $M = 1,84$ ,  $SD = 0,846$ ,  $Mdn = 1,75$  vs.  $M = 1,38$ ,  $SD = 0,466$ ,  $Mdn = 1,25$ ). Rodiče dětí s PAS častěji dávali svým dětem něco k jídlu, když zažívaly silné emoce ( $M = 2,12$ ,  $SD = 0,646$ ,  $Mdn = 2$  vs.  $M = 1,35$ ,  $SD = 0,550$ ,  $Mdn = 1$ ).

## **Klíčová slova**

stravování, porucha autistického spektra, předškolní věk