

Abstrakt

Mentální anorexie je duševní onemocnění, vyznačující se poruchou tělesného schématu, odmítáním potravy a dalšími znaky. Cílem práce bylo změřit diskriminační práh, schopnost vyhodnocování sensorických vjemů a tělesného sebepojetí u adolescentních pacientek hospitalizovaných s mentální anorexií. Cílem byla vidina možnosti přispět k objasnění k stále ne zcela známým neurofyzilogických aspektům, které u mentální anorexie nacházíme. Výsledky byly porovnány s kontrolní skupinou. Naše skupina čítala 18 pacientek s průměrným věkem $14,7 \pm 0,71$ let a 18 probandek v kontrolní skupině s průměrným věkem $15,3 \pm 0,71$ let. Modalitu diskriminačního čítí jsme měřili na 3 tělesných lokalitách – na paži, mezi lopatkami a na břiše modifikovanou šuplérrou. Pro testování schopnosti vyhodnocování sensorického vjemu jsme využili test dle Petrie. Tělesné sebepojetí jsme testovali BAT dotazníkem. Testování probíhalo jednorázově v standardizovaných podmínkách v podobnou denní hodinu. Signifikantně významná se ukázala odlišnost dvoubodové diskriminace v oblasti mezi lopatkami na hladině významnosti $\alpha = 5 \%$ s p-hodnotou $p = 0,0001$. Taktéž se prokázala statisticky významná odchylka v tělesném sebepojetí na hladině významnosti $\alpha = 5 \%$ s p-hodnotou $p = 0,017$. Výsledkem bylo, že pacientky s mentální anorexií prokazovaly vyšší práh dvoubodové diskriminace v mezilopatkové oblasti a vyšší znepokojení se svým tělem oproti kontrolní skupině.