

Pacientský soubor

Pacient 1

- Věk: 73 let
- Pohlaví: muž
- Základní dg: fr. krčku kosti stehenní vpravo
- Pooperační den: 2.
- Typ operace: PFH
- Přidružené dg: arteriální hypertenze
- AA: neguje
- Zhodnocení stavu pacienta: spolupracující, orientován – místem, časem, osobou, afebrilní, DKK bez známek TEN
- Popis rány: operační rána kryta HydroTac náplastí – bez průsaku, RD
- Bolest: VAS 4 – v rámci ranní medikace podán Novalgin 500mg p.o

Pacient 2

- Věk: 91 let
- Pohlaví: muž
- Základní dg: fr. pertrochanterica sinistra
- Pooperační den: 2.
- Typ operace: PFH
- Přidružené dg: DM II. typu (inzulin), chronické srdeční selhání, chronická anemie
- AA: neguje
- Zhodnocení stavu pacienta: spolupracující, orientován – místem, časem, osobou, DKK bez známek TEN
- Popis rány: operační rána kryta HydroTac náplastí – bez průsaku, RD
- Bolest: VAS 5 - v rámci ranní medikace podán Palgotal 650mg p.o

Pacient 3

- Věk: 96 let
- Pohlaví: muž
- Základní dg: fr. krčku kosti stehenní vpravo
- Pooperační den: 2.
- Typ operace: CCEP
- Přidružené dg: bilaterální glaukom, benigní hyperplazie prostaty
- AA: neguje
- Zhodnocení stavu pacienta: lehké delirium, spolupracuje, FF v normě, DKK bez známek TEN
- Popis rány: operační rána kryta HydroTac náplastí – bez průsaku, RD
- Bolest: VAS 4 - v rámci ranní medikace podán Novalgin 500mg p.o

Pacient 4

- Věk: 81 let
- Pohlaví: muž
- Základní dg: reimplantace TEP kyčle vpravo
- Pooperační den: 2.
- Typ operace: TMARS/ Wagner
- Přidružené dg: flutter síní, arteriální hypertenze, karcinom prostaty, hyperurikémie
- AA: pyl
- Zhodnocení stavu pacienta: spolupracující, orientován – místem, časem, osobou, FF v normě, DKK bez známek TEN
- Popis rány: operační rána kryta HydroTac náplastí – bez průsaku, RD
- Bolest: VAS 5 - v rámci ranní medikace podán Palgotal 650mg p.o

Pacient 5

- Věk: 92 let
- Pohlaví: muž
- Základní dg: osteosyntéza distálního femuru
- Pooperační den: 3.
- Typ operace: DFP
- Přidružené dg: DM II. typu (dieta), arteriální hypertenze
- AA: penicilin
- Zhodnocení stavu pacienta: spolupracující, spavý, orientován – místem, časem, osobou, FF v normě, DKK bez známek TEN
- Popis rány: operační rána bez zarudnutí, okolí svorek klidné, rána po RD – mírná sangvinózní sekrece, bez otoku a hematomu
- Bolest: VAS 8 - v rámci ranní medikace podán Neodolpasse i.v

Pacient 6

- Věk: 78 let
- Pohlaví: muž
- Základní dg: fr. krčku kosti stehenní vlevo
- Pooperační den: 3.
- Typ operace: PFH
- Přidružené dg: DM II. typu (dieta)
- AA: neguje
- Zhodnocení stavu pacienta: spolupracující, orientován – místem, časem, osobou, FF v normě, DKK bez známek TEN
- Popis rány: operační rána kryta HydroTac náplastí – bez průsaku, RD
- Bolest: VAS 5 - v rámci ranní medikace podán Palgotal 650mg p.o

Pacient 7

- Věk: 95 let
- Pohlaví: muž
- Základní dg: fr. intertrochanterica lat. sinistra
- Pooperační den: 4.
- Typ operace: PFH
- Přidružené dg: arteriální hypertenze, slabozrakost, na pravé oko nevidomý
- AA: neguje
- Zhodnocení stavu pacienta: spolupracující, orientován – místem, časem, osobou, FF v normě, DKK bez známek TEN
- Popis rány: operační rána bez zarudnutí, okolí stehů klidné, bez sekrece, otoku a hematomu
- Bolest: VAS 3 - v rámci ranní medikace podán Novalgin 500mg p.o

Pacient 8

- Věk: 91 let
- Pohlaví: muž
- Základní dg: fr. pertrochanterica lat. dextra
- Pooperační den: 7.
- Typ operace: PFH
- Přidružené dg: DM II. typu (dieta), arteriální hypertenze, DKK varixy
- AA: neguje
- Zhodnocení stavu pacienta: spolupracující, orientován – místem, časem, osobou, DKK bez známek TEN
- Popis rány: operační rána bez zarudnutí, okolí svorek klidné, rána po RD – mírná sangvinózní sekrece, bez otoku a hematomu
- Bolest: VAS 4 - v rámci ranní medikace podán Novalgin 500mg p.o

Pacient 9

- Věk: 45 let
- Pohlaví: žena
- Základní dg: léze mediálního menisku kolena vlevo
- Pooperační den: 1.
- Typ operace: artroskopie
- Přidružené dg: 0
- AA: neguje
- Zhodnocení stavu pacienta: spolupracující, orientována – místem, časem, osobou, afebrilní, normotenzní, DKK bez známek TEN
- Popis rány: operační rána bez zarudnutí, okolí stehů klidné, bez otoku a hematomu
- Bolest: VAS 3 - v rámci ranní medikace podán Novalgin 500mg p.o

Pacient 10

- Věk: 75 let
- Pohlaví: muž
- Základní dg: infekt TEP kolene vlevo
- Pooperační den: 4.
- Typ operace: revize, kultivace, debridement, pulzní laváž, drenáž
- Přidružené dg: dekubity – obě paty (PDK – 3. stupeň – otevřená, LDK – 3. stupeň – zavřená), ischemická choroba dolních končetin, ischemická choroba srdeční, hyperlipidémie, hyperurikémie
- AA: neguje
- Zhodnocení stavu pacienta: spolupracující, orientován – místem, časem, osobou, FF v normě
- Popis rány: operační rána kryta HydroTac náplastí – bez průsaku, RD
- Bolest: VAS 3 - v rámci ranní medikace podán Novalgin 500mg p.o

Pacient 11

- Věk: 61 let
- Pohlaví: muž
- Základní dg: infekční uvolnění TEP levého kolene
- Pooperační den: 5.
- Typ operace: reimplantace, spacer
- Přidružené dg: hyperurikémie
- AA: neguje
- Zhodnocení stavu pacienta: spolupracující, orientován – místem, časem, osobou, FF v normě, DKK bez známek TEN
- Popis rány: operační rána bez zarudnutí, okolí svorek klidné, bez otoku a hematomu
- Bolest: VAS 5 - v rámci ranní medikace podán Palgotal 650mg p.o

Pacient 12

- Věk: 41 let
- Pohlaví: muž
- Základní dg: fr. pravého hlezna
- Pooperační den: 1.
- Typ operace: cerkláž, repozice, drain
- Přidružené dg: 0
- AA: neguje
- Zhodnocení stavu pacienta: spolupracující, orientován – místem, časem, osobou, FF v normě, DKK bez známek TEN
- Popis rány: operační rána bez zarudnutí, okolí stehů klidné, bez otoku a hematomu, rána po RD s mírnou sangvinózní sekrecí
- Bolest: VAS 3 - v rámci ranní medikace podán Novalgin 500mg p.o

Pacient 13

- Věk: 86 let
- Pohlaví: muž
- Základní dg: fr. levého hlezna
- Pooperační den: 1.
- Typ operace: ORIF
- Přidružené dg: arteriální hypertenze
- AA: neguje
- Zhodnocení stavu pacienta: spolupracující, orientován – místem, časem, osobou, FF v normě, DKK bez známek TEN
- Popis rány: operační rána bez zarudnutí, okolí svorek klidné, mírný otok a hematom.
- Bolest: VAS 4 - v rámci ranní medikace podán Novalgin 500mg p.o

Pacient 14

- Věk: 79 let
- Pohlaví: žena
- Základní dg: fr. bimalleolaris lat. dextra
- Pooperační den: 3.
- Typ operace: transfixace, K – dráty
- Přidružené dg: hypercholesterolémie, hyperthyreóza
- AA: mesocain
- Zhodnocení stavu pacienta: spolupracující, orientovaná – místem, časem, osobou, FF v normě, DKK bez známek TEN
- Popis rány: operační rána bez zarudnutí, okolí stehů klidné, bez otoku a hematomu
- Bolest: VAS 3 - v rámci ranní medikace podán Novalgin 500mg p.o

Pacient 15

- Věk: 82 let
- Pohlaví: muž
- Základní dg: fr. trimalleolaris. lat. sinistra distalis
- Pooperační den: 4.
- Typ operace: osteosyntéza
- Přidružené dg: karcinom prostaty, arteriální hypertenze, revmatická polymyalgie
- AA: neguje
- Zhodnocení stavu pacienta: spolupracující, orientován – místem, časem, osobou, FF v normě, DKK bez známek TEN
- Popis rány: operační rána bez zarudnutí, okolí stehů klidné, bez otoku a hematomu, RD
- Bolest: VAS 4 - v rámci ranní medikace podán Novalgin 500mg p.o

Pacient 16

- Věk: 21 let
- Pohlaví: muž
- Základní dg: fr. II. a III. metacarpu vpravo
- Pooperační den: 1.
- Typ operace: osteosyntéza
- Přidružené dg: 0
- AA: neguje
- Zhodnocení stavu pacienta: spolupracující, orientován – místem, časem, osobou, FF v normě, DKK bez známek TEN
- Popis rány: operační rána bez zarudnutí, okolí stehů klidné, bez otoku a hematomu
- Bolest: VAS 4 - v rámci ranní medikace podán Novalgin 500mg p.o

Pacient 17

- Věk: 20 let
- Pohlaví: muž
- Základní dg: recidivující luxace ramene vpravo
- Pooperační den: 1.
- Typ operace: artroskopie
- Přidružené dg: 0
- AA: neguje
- Zhodnocení stavu pacienta: spolupracující, orientován – místem, časem, osobou, FF v normě, DKK bez známek TEN
- Popis rány: operační rána bez zarudnutí, okolí stehů klidné, bez otoku a hematomu, RD
- Bolest: VAS 1 – pacient odmítl analgetika

Pacient 18

- Věk: 23 let
- Pohlaví: muž
- Základní dg: fr. báze V. metatarsu vpravo
- Pooperační den: 1.
- Typ operace: osteosytéza
- Přidružené dg: 0
- AA: kočky, psi
- Zhodnocení stavu pacienta: spolupracující, orientován – místem, časem, osobou, FF v normě, DKK bez známek TEN
- Popis rány: operační rána bez zarudnutí, okolí stehů klidné, bez otoku a hematomu
- Bolest: VAS 2 – pacient odmítl analgetika

Pacient 19

- Věk: 71 let
- Pohlaví: žena
- Základní dg: fr. proximálního humeru vlevo
- Pooperační den: 2.
- Typ operace: osteosyntéza
- Přidružené dg: Bechtěrevova choroba
- AA: neguje
- Zhodnocení stavu pacienta: spolupracující, orientována – místem, časem, osobou
- Popis rány: operační rána bez zarudnutí, okolí stehů klidné, bez otoku a hematomu, RD
- Bolest: VAS 3 - v rámci ranní medikace podán Novalgin 500mg p.o

Pacient 20

- Věk: 60 let
- Pohlaví: žena
- Základní dg: fr. cruris lat. sinistra aperta
- Pooperační den: 5.
- Typ operace: osteosyntéza
- Přidružené dg: arteriální hypertenze, inkontinence moči
- AA: penicilin, náplast
- Zhodnocení stavu pacienta: spolupracující, orientována – místem, časem, osobou, FF v normě, DKK bez známek TEN
- Popis rány: operační rána bez zarudnutí, okolí stehů klidné, bez otoku a hematomu
- Bolest: VAS 4 - v rámci ranní medikace podán Novalgin 500mg p.o

Záznamový arch autorky

Obrázek 1 - Záznamový arch autorky

TYP PŘEVAZŮ

- Kyčel
- Koleno
- Rameno
- Loket
- Hlezno
- Jiné:

- Svorky
- Stehy

Drén

- Ano
- Ne

ZHODNOCENÍ OPERAČNÍ RÁNY

Zarudnutí

- Ano
- Ne

Okolí stehů/svorek

- Klidné
- Znamky zánětu -

Zvýšená teplota v okolí rány

- Ano
- Ne

Otok

- Ano
- Ne

Sekrece z rány

- Ano – jaká
- Ne

Hematom

- Ano
- Ne

Bolest (VAS)

- Ano – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10
- Ne

INFORMACE O PACIENTOVI

Základní dg.:

Den po operaci:

Typ operace:

Zhodnocení pacienta:

Přidružené dg.:

OTÁZKY NA SESTRU

Jméno:

Věk sestry:

Dosažené vzdělání: DiS. – Bc. – Mgr. – bez titulu

Roky v praxi celkem:

Roky praxe na Ortopedii:

RADY A VYCHYTÁVKY

POZNÁMKY

POSTUP PŘEVAZU

(typ lepení před a po převazu, použitý materiál+postup)