

## Abstrakt

Spotřeba antidepresiv ze skupiny SARI, NDRI a RIMA v České republice

Univerzita Karlova

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Katedra sociální a klinické farmacie

Autor: Veronika Bucková

Vedoucí diplomové práce: PharmDr. Pavel Horký, Ph.D.

Antidepresiva jsou léčiva užívaná především k léčbě patologicky pokleslé nálady a úzkostných poruch. Sledovaná antidepresiva v této práci ze skupin SARI, NDRI a RIMA se dále uplatňují při léčbě nespavosti, odvykání kouření, jako podpora při redukci váhy a u některých psychogenních sexuálních dysfunkcí.

Cílem práce bylo analyzovat spotřebu antidepresiv ze skupin SARI, NDRI a RIMA v České republice.

Data byla pro tuto práci získána z databáze Státního ústavu pro kontrolu léčiv na základě povinného hlášení o objemu léčivých přípravků dodávaných distributory do lékáren a dalších zdravotnických zařízení. Spotřeba byla sledována v období od 1.1.2008 do 31.12.2020. Byla použita metodika typu DUR a spotřeba byla vyjádřena v počtu definovaných denních dávek na tisíc obyvatel za den (DID).

Výsledky potvrzují stoupající trend spotřeby antidepresiv pouze v případě trazodonu (SARI), jehož spotřeba se oproti roku 2008 zvýšila 3,8krát. Možným vysvětlením je použití trazodonu jako léčiva v terapii nespavosti a také to, že nezpůsobuje sexuální dysfunkce, ale naopak působí pozitivně, tudíž je vhodný u sexuálně aktivních pacientů. U moklobemidu (RIMA) lze pozorovat spíše pozvolný pokles spotřeby. Spotřeba bupropionu (NDRI) má též mírně klesající trend, ovšem ne velmi výrazný.

Klíčová slova: spotřeba léčiv, SARI, NDRI, RIMA, trazodon, bupropion, moklobemid