

Abstrakt

Práce se věnuje problematice epilepsií, jejich dvou nejčastějších psychiatrických komorbidit, a možnostem screeningu a diagnostiky těchto komorbidit. Literárně přehledová část přibližuje čtenáři problematiku epilepsií, dále uvádí klasifikaci depresivní a generalizované úzkostné poruchy, jejich souvislost s epilepsií a seznamuje s metodami, v současné době používanými, ke screeningu těchto duševních nemocí. V poslední kapitole představuje čtenáři metodu Emočních teploměrů, její vznik a vývoj, a doposud publikované práce věnující, se použití této metody u lidí s epilepsií.

Výzkumná část si klade za cíl ověření kriteriální validity Emočních teploměrů pro screening deprese a úzkosti a jejich porovnání s konvenčními metodami BDI-II a GAD-7, přičemž jako referenční metoda jsou použity dílčí moduly M.I.N.I., zlatého standardu vycházejícího z diagnostických kritérií DSM-IV a MKN-10. Dalším cílem je určit potenciální rizikové faktory stran užívaných protizáchvatových farmak a sociodemografických a klinických charakteristik epilepsie. Výzkum zahrnuje celkem 222 osob s epilepsií. Výsledky založené na analýze ROC křivky ukazují na dobré výsledky z hlediska souběžné validity Emočních teploměrů a na vhodnost jejich použití pro screening deprese a úzkosti u lidí s epilepsií v rámci pravidelných návštěv neurologických ambulancí. Výsledky regresní analýzy ukázaly, že výskyt deprese a úzkosti souvisí s množstvím užívaných ASM, definovanou denní dávkou ASM, třemi konkrétními druhy ASM, počtem let vzdělání a vdovstvím.

Klíčová slova

Emoční teploměry, epilepsie, screening, deprese, úzkost