

Abstrakt

Cílem bakalářské práce byla deskriptivní analýza vybraných anamnestických charakteristik adolescentních FtM (female-to-male) žadatelů o změnu pohlaví, s účelem lépe porozumět této populaci v rámci ČR. K tomu byla využita data pacientů Sexuologického ústavu 1. LF UK a VFN v Praze (N = 78), z let 2022–2023, jejichž věk byl v době nástupu do léčby minimálně 15 a méně než 19 let (M = 16.3, SD = 1.00).

Jako typické se ukázaly pozdní nástup genderového nesouladu (GN) s uvědoměním si genderové identity (GI) průměrně ve 13,2 letech (SD 1,98), dále minoritní sexuální orientace, přání kompletní přeměny pohlaví a kompletní sociální tranzice v době vstupu do léčby zahájena průměrně v 15,1 letech (SD 1,29). Téměř polovina FtM měla zkušenost s partnerským vztahem, ale sexuálně aktivních byla pouze třetina. Polovina pacientů měla v anamnéze farmakoterapii indikovanou psychiatrem a více než pětina hospitalizaci na psychiatrii. Vyskytovalo se u nich množství psychiatrických komorbidit. Nejčastější komorbiditou byl úzkostně-depresivní syndrom přítomný u třetiny FtM. Více než polovina měla v anamnéze sebepoškození, suicidální ideaci a více než čtvrtina sebevražedný pokus, který byl většinou opakovaný. Cílené psychologické vyšetření odhalilo psychickou nestabilitu u dvou třetin výzkumného souboru a anomální vývoj osobnosti u více než čtvrtiny. Přijetí GI oběma rodiči pocítovala pouze polovina pacientů.

Výsledky implikují nutnost hlubšího studia interních i externích faktorů a specifických vývojových kontextů, jež mají vliv na mentální zdraví transgender adolescentů, které se u FtM zdá být do značné míry narušené.

Klíčová slova: adolescentní female-to-male; mladiství transgender muži; genderový nesoulad; psychiatrické komorbidity; anamnestické charakteristiky