

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FARMACEUTICKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ

Téma rigorózní práce:

***Sledování výdeje hypolipidemik v lékárně
s odbornými pracovišti v letech 2005-6***

Jméno studenta, studentky:

Mgr. Anna Sedláčková

Jméno oponenta rigorózní práce:

Doc. MUDr. Ivan Tilšer, CSc.

I. Posudek oponenta rigorózní práce

Mgr. Sedláčková si vytkla za cíl své rigorózní práce sledovat a porovnat spotřebu a spektrum vydávaných hypolipidemik ve zvolené lékárně v letech 2005-2006. Na základě podrobné měsíční analýzy spotřeby atorvastatinu, simvastatinu a fenofibrátu také pozorovat, zda se na vývoji spotřeby projeví např. uvolnění preskripce atorvastatinu pro praktické lékaře od 2. pololetí 2005. Práce prokázala, že v průběhu sledování došlo ke zvýšení spotřeby statinů a snížení spotřeby fibrátů, na postu nejčastěji vydávaného hypolipidemika byl dosud vedoucí simvastatin vystřídán atorvastatinem. Autorka se tedy pohybovala v tématické oblasti velice důležité a provázené rychlým vývojem poznatků. Rigorózní práce je napsána na 91 stránkách a skládá se ze dvou hlavních částí, teoretické a praktické. V práci je zahrnuto 7 grafů, 16 tabulek a 62 citací našich i zahraničních autorů. Autorka práci napsala srozumitelně, výsledky prezentovala přehledně a střízlivě je diskutovala. Po formální stránce má práce dobrou úroveň.

Připomínky a Komentáře:

- Doporučení pro farmakoterapii uvedené na str. 28 (cit. 15 z roku 2001) je již zastaralé.
- Je skutečně tabulka č. 7 na str. 25 z citace č. 16? Z kterého roku je doporučení v tabulce č. 7 podle Evropských společností pro aterosklerózu?
- V kapitole farmakoterapie hyperlipoproteinemií by možná by bylo vhodnější pojednat odděleně o léčivech již užívaných v praxi a o léčivech perspektivních, v praxi dosud neužívaných. Zajímavé jsou i nové poznatky, např. o torcetrapibu a rimonabantu (uváděných také na str. 55). Torcetrapib sice může zvýšit hladinu HDL cholesterolu až o 100%, ovšem studie ILLUSTRATE ukázala, že zvýšení HDL nevedlo ke snížení progresse rozvoje aterosklerózy ve srovnání s placebem. Rimonabant, který působí na endokannabinoidní receptory, byl pro zvýšený výskyt depresí stažen z trhu.
- Počet 6 čísel v desetinném číslování kapitol je dosti vysoký a nepřispívá již k přehlednosti práce.


Tyto připomínky však nejsou zásadního rázu a nedotýkají se podstatných stránek celé práce.

Dotazy:

- Jaký současný doporučený postup České společnosti pro aterosklerózu u asymptomatických osob s dyslipidemií?
- Jaký je přínos studie JUPITER, sledující účinky rosuvastatinu?

Předloženou práci doporučuji k obhajobě.

V Hradci Králové dne: 12.3.2009


Podpis oponenta rigorózní práce