

Abstrakt

Hrušková, M.: Význam fytotherapie při léčbě benigní hyperplazie prostaty. Rigorózní práce, Karlova Univerzita v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Katedra Farmaceutické botaniky a ekologie, Hradec Králové 2010, s.72

Tato rigorózní práce se týká odborné rešerše na téma: Význam fytotherapie při léčbě benigní hyperplazie prostaty.

Cílem RP bylo zjistit, jak velký význam a podíl má fytotherapie v léčbě BHP. Průzkum byl proveden na základě vyplnění dotazníků (počet 100) s pacienty v Nemocniční lékárně Oblastní nemocnice Kolín, a.s. a z malé části v Urologické ambulanci na Urologickém oddělení Oblastní nemocnice Kolín, a.s.

Z našeho průzkumu vyplývá, že fytotherapie má svůj zřejmý význam při léčbě počátečního stádia BHP (I. a II. stádium). Podíl fytotherapie v léčbě BHP činí 38%, 1% kombinace obou terapií a 61% tvoří farmakoterapie.

Rostliny, které jsou především využívány při léčbě BHP, jsou seřazeny sestupně podle zjištěných výsledků: *Serenoa repens*, *Epilobium parviflorum*, *Prunus africana*.