

Souhrn

ÚVOD: Po ukončení ortodontické terapie je nezbytné zhodnotit stabilitu okluze jako znak dlouhodobé úspěšnosti terapie, což zároveň může ošetřujícímu lékaři posloužit jako měřítko kvality jeho práce. Tyto výsledky terapie mohou být hodnoceny různými indexy, mezi nimiž za nejspolehlivější a nejnovější vyšetření považujeme PAR index.

CÍL: Studie byla zaměřena na stanovení úspěšnosti ortodontické terapie pomocí PAR indexu.

METODIKA: Sledovaný soubor se skládal z 69 pacientů, kteří splňovali podmínky pro zařazení do této studie. Pomocí PAR indexu byly hodnoceny ortodontické studijní modely pacientů, a to před započatím léčby, bez prostředně po ní a za dva roky po jejím ukončení. Výsledky byly hodnoceny pomocí nomogramů.

VÝSLEDKY: Většina pacientů nevykazovala během sledovaného období po ukončení léčby žádné výraznější změny.

ZÁVĚR: Stav okluze u většiny pacientů nevykazoval během dvou let po ukončení terapie žádné výraznější změny. Ortodontická léčba tedy byla ve sledovaném časovém období zcela stabilní. Bylo by vhodné ve studii pokračovat a sledovat výsledky ortodontického ošetření v daném souboru i v dalších letech, již bez užití retenčních zařízení.