

Kolorektální karcinom je druhý nejčastější maligní nádor. Česká republika dlouhodobě patří mezi státy s nejvyšší incidencí tohoto nádoru. Kolorektální karcinom patří mezi nádory, u nichž je možná jak primární (výživa) tak i sekundární prevence (vyhledávání asymptomatických jedinců v časném stadiu onemocnění). V roce 2000 byl v ČR zaveden celoplošný screening pomocí Haemoccult testu a následných vyšetření (totální kolonoskopie v případě pozitivního testu).

V této práci jsme hodnotili účinnost tohoto screeningu. Metodika: u pacientů léčených v roce 2005 na Onkologické klinice FNKV s diagnózou kolorektální karcinom jsme zjišťovali TNM stadium a způsob diagnózy (záchyt ve screeningu nebo symptomatický pacient). Předpokládali jsme, že oproti minulým studiím dojde k většímu zastoupení pacientů v časných stadiích, jako i k většímu podílu pacientů zachycených screeningem.

Výsledky: došlo k signifikantnímu zvýšení poměrného zastoupení pacientů zachycených ve screeningu. Tento rozdíl se však nepromítá do zastoupení pacientů v časném stadiu – nenašli jsme signifikantní zvýšení v počtu pacientů v časném stadiu oproti minulým studiím.

Výsledky však nelze zobecňovat, zkoumaný soubor pacientů byl příliš malý, složen z pacientů Onkologické kliniky, kam jsou odesíláni pacienti v pokročilejších stadiích.