

## Východiska

Studie SAMSHA z let 2006 a 2009 poukazující na trend zneužívání opioidních analgetik (léků na bolest) na lékařský předpis. Pilotní studie byla cílená na aplikování dat z uvedených studií do podmínek České republiky v rámci Center a Ambulancí pro léčbu bolesti.

## Metody

Data sbírána od října 2009 do února 2010 za pomoci dotazníkové metody na výzkumném vzorku ve věkové kohortě 18 – 64 let. Výzkumný vzorek byl vybrán z pacientů trpících chronickou bolestí a užívající opioidní analgetika na lékařský předpis po dobu alespoň dvou let.

V průběhu ledna 2010 až března 2010 probíhala v rámci této studie substudie. Výzkumný vzorek představovali lékaři a zdravotní sestry Center a Ambulancí pro léčbu bolesti.

## Výsledky

Na základě sebraných dat u celkového počtu 83 respondentů jsme poukázali na nedostatek dat, abychom mohli jednoznačně prokázat trend abúzu opioidních analgetik na lékařský předpis v kombinaci s alkoholem nebo jinou nealkoholovou návykovou látkou.

Na základě nedostatečného počtu respondentů nelze udělat výstup z těchto získaných dat.

## Závěry

Doporučení týkající se dalšího postupu v případě pokračování studie. Volba rozdílné metody pro sběr dat a jejich následné vyhodnocování.

Klíčová slova: opioidní analgetika na lékařský předpis, chronická bolest, alkohol, nealkoholové návykové látky, zneužívání