

PŘÍLOHY

Příloha č. 1 Očkovací kalendář platný v ČR od března 2009 [33]

Rok	Měsíc	Týden	Očkování proti		
			Záškrtu, tetanu, dávivému kašli a hemofilovým nákazám typu b, virové hepatitidě typu B a dětské přenosné obrně (DTaP-HBV-IPV+Hib), 6)	Tuberkulóze (TBC)	Spalničkám, příušnicím a zarděnkám (MMR)
1	1	1–2		od 4. dne do 6 týdnů po narození, 1. dávka	
		3–4			
	2	5–6			
		7–8			
	3	9–10			
		11–12			
	4	13–14	od 13. týdne; 1. dávka DTaP-IPV-HBV+Hib, 1)		
		15–16			
	5	17–18	po min. 1 měsíci od předešlé dávky; 2. dávka DTaP-IPV-HBV+Hib		
		19–20			
6–8	po min. 1 měsíci od předešlé dávky; 3. dávka DTaP-IPV-HBV+Hib				
9–12					
2	13–14	po minimálně 6 měsících od podání 3. dávky nejpozději do 18. měsíce života; 4. dávka DTaP-IPV-HBV+Hib	ve 2.-3. roce revakcinace tuberkulín negativních RIZIKOVÝCH dětí a dětí, které nebyly po narození očkované	od 15. měsíce, 1. dávka	
	15–16				
	17–18				
	19–20				
	21–22				
	23–24	21.-25. měsíc, 2. dávka, 5)			
3–4					
5–6	v 5 letech (A); 5. dávka DTaP, 2)				
7–8					
9–10	v 10 letech (B); 5. dávka IPV + 6. dávka Tdap				
11–12	ve 12 letech (C); HBV imunizace 3 dávkami, 3)				
13–14	ve 14 letech (D); 6. dávka T, 4)				
15–24					
25–26	v 25 letech (E); 7. dávka T, 4)				

Dodatek k příloze č. 1:

- 1)** První dávka DTaP-HBV-IPV+Hib se podává vždy po zhojení jizvy po očkování proti TBC
 - 2)** Podává se vakcína pouze proti záškrtu, tetanu a dávivému kašli
 - 3)** Očkování proti virové hepatitidě typu B se provádí pouze u dětí, které nebyly v minulosti očkovány; podávají se tři dávky ve schématu 0., 1., 6. měsíc
 - 4)** Tetanová vakcína se následně podává každých 10–15 let, jako tzv. posilující očkování
 - 5)** Druhou dávku vakcíny proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám je podle nové vyhlášky možné podat i později (bez omezení), dlouhodobé odkládání druhé dávky není vhodné z důvodu snížení protektivního účinku zejména u příušnicové vakcíny
 - 6)** D – vakcína proti záškrtu, d - vakcína proti záškrtu starších dětí nebo dospělých osob, T – vakcína proti tetanu, aP – acelulární pertussová vakcína, ap - acelulární pertussová vakcína určena pro starší děti a dospělé osoby, HBV – vakcína proti virové hepatitidě typu B, IPV – inaktivovaná vakcína proti dětské přenosné obrně, Hib – vakcína proti nálezům Haemophilus influenzae typu b
- (A)** od dovršení 5. roku do dovršení 6. roku
- (B)** od dovršení 10. roku do dovršení 11. roku
- (C)** od dovršení 12. roku do dovršení 13. roku
- (D)** od dovršení 14. roku do dovršení 15. roku (platí jen pro děti neočkované Tdap v 10 letech)
- (E)** od dovršení 25. roku do dovršení 26. roku (platí jen pro dospělé očkované Tdap v 10 letech)

Příloha č. 2 Očkovací kalendář platný v ČR od března 2009 pro novorozence
HBsAg pozitivních matek [33]

Rok	Měsíc	Týden	Očkování proti		
			Záškrtu, tetanu, dávivému kašli a hemofilovým nákazám typu b, virové hepatitidě typu B a dětské přenosné obrně (DTaP-HBV-IPV+Hib), 4)	Tuberkulóze (TBC)	Spalničkám, příušnicím a zarděnkám (MMR)
1	1	1–2	do 24 hodin po narození; 1. dávka HBV		
		3–4			
	2	5–6	6. týden po narození; 1. dávka DTaP-IPV-HBV+Hib		
		7–8			
	3	9–10	10. týden po narození; 2. dávka DTaP-IPV-HBV+Hib		
		11–12			
	4	13–14	14. týden po narození; 3. dávka DTaP-IPV-HBV+Hib		
		15–16			
	5	17–18			
		19–20			
	6–8				
	9–12				
2	13–14	po minimálně 6 měsících od podání 3. dávky nejpozději do 18. měsíce života; 4. dávka DTaP-IPV-HBV+Hib	ve 2.-3. roce primovakcinace tuberkulín negativních dětí, po ukončení Základního Pravidelného očkování proti ostatním infekčním chorobám		
	15–16			od 15. měsíce, 1. dávka	
	17–18				
	19–20				
	21–22				
	23–24			21.-25. měsíc, 2. dávka, 3)	
3–4					
5–6		v 5 letech (A); 5. dávka DTaP, 1)			
7–8					
9–10		v 10 letech (B); 5. dávka IPV + 6. dávka Tdap			
11–12					
13–14					
		ve 14 letech (D); 6. dávka T, 2)			
15–24					
25–26		v 25 letech (E); 7. dávka T, 2)			

Dodatek k příloze č. 2:

- 1)** Podává se vakcína pouze proti záškrtu, tetanu a dávivému kašli
 - 2)** Tetanová vakcína se následně podává každých 10–15 let, jako tzv. posilující očkování
 - 3)** Druhou dávku vakcíny proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám je podle nové vyhlášky možné podat i později (bez omezení), dlouhodobé odkládání druhé dávky není vhodné z důvodu snížení protektivního účinku zejména příušnicové vakcíny
 - 4)** D – vakcína proti záškrtu, d - vakcína proti záškrtu starších dětí nebo dospělých osob, T – vakcína proti tetanu, aP – acelulární pertussová vakcína, ap - acelulární pertussová vakcína určena pro starší děti a dospělé osoby, HBV – vakcína proti virové hepatitidě typu B, IPV – inaktivovaná vakcína proti dětské přenosné obrně, Hib – vakcína proti nákazám *Haemophilus influenzae* typu b
- (A) od dovršení 5. roku do dovršení 6. roku
- (B) od dovršení 10. roku do dovršení 11. roku
- (C) od dovršení 14. roku do dovršení 15. roku
- (D) od dovršení 14. roku do dovršení 15. roku (platí jen pro děti neočkované Tdap v 10 letech)
- (E) od dovršení 25. roku do dovršení 26. roku (platí jen pro dospělé očkované Tdap v 10 letech)