

SOUHRN

Význam metforminu v léčbě diabetes mellitus 2.typu

Mgr. Andrea Kučerová, Katedra sociální a klinické farmacie, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, rigorózní práce, 2010

Metformin je biguanid, který si při svém terapeutickém uplatnění prošel obdobím zatracení a pádu, poté opět vzestupu, a to až na pomyslný farmakologicko-terapeutický vrchol, kdy se stal „zlatým standardem“ v léčbě pacienta s diabetes mellitus 2.typu /DM 2.typu/. V současné době jej odborné světové i české autority doporučují jako lék 1.volby již při stanovení diagnózy společně s dietou a fyzickou aktivitou.

Jak následuje a odráží diabetologický preskripční terén tato Doporučení? Co brání lékařům – preskriptorům v aplikaci Doporučení do jejich každodenní lékařské praxe?

Cílem a předmětem této práce je problematika léčby DM 2.typu pomocí perorálních antidiabetik /PAD/ se zvláštním zaměřením na rozhodovací mechanismy vybraných preskripčních skupin lékařů. K lepšímu pochopení a odůvodnění těchto preskripčních návyků je třeba v teoretické části práce připomenout historický vývoj metforminu, dále pak vývoj a změny jeho pozice v rámci odborných Doporučení /guidelines/ a stejně tak vývoj z hlediska nárůstu jeho spotřeby na českém farmaceutickém trhu, coby odrazu reálného použití léku v medicínské praxi.

Praktická část této práce se tedy zabývá analýzou postojů a motivy preskriptorů – diabetologů a praktických lékařů – k výběru a nasazení typu PAD u pacienta s DM 2.typu. Tato analýza odráží detailně výstupy z června 2006.

Problematika zahajování léčby diabetika 2.typu pomocí PAD je velmi komplexní a nelze ji osvětlit jednou či několika větami, je třeba na ni nahlížet v celkovém kontextu pacient-lékař-odborná společnost-zdravotní pojišťovna-farmaceutická firma/výrobce.

Tato práce nezohledňuje otázku finančních nákladů lékaře-preskriptora na léčbu pomocí PAD.