

ERRATA

Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Katedra: Farmaceutické technologie

Školitel: Doc. RNDr. Milan Řehula, CSc.

Posluchač: Adéla Havelková

Název diplomové práce: Lisovatelnost různých šarží léku simvastatin

Oprava č. 1:

Původní text: str. č. 12, řádek č. 11

Předbobtnalý škrob se ve farmacii využívá při výrobě orálních tablet a kapslí jako pojivo, *ředidlo* a rozvolňovadlo.

Oprava textu:

Předbobtnalý škrob se ve farmacii využívá při výrobě orálních tablet a kapslí jako pojivo, *plnivo* a rozvolňovadlo.

Oprava č. 2:

Původní text: str. 13, řádek č. 17

Ve farmacii se často používá jako *pojivo*, *plnivo* a *ředidlo* v kapslích a tabletách, méně v lyofilizátech a kojenecké výživě.

Oprava textu:

Ve farmacii se často používá jako *pojivo* a *plnivo* v kapslích a tabletách, méně v lyofilizátech a kojenecké výživě.

Oprava č. 3:

Původní text: str. 33, řádek č. 3

Simvastatin různé šarže

Oprava textu:

Simvastatin různé šarže *jednoho druhu přípravku*

Oprava č. 4:

Původní text: str. č. 65

Graf 4: E2 při lisovacím tlaku 15 kN

Oprava textu:

Graf 4: E2 při lisovacím tlaku 5 kN

Oprava č. 5:

Chybně uvedené jednotky parametrů: str. 77 – 81:

Původní jednotky: E1 [J/m³], E2 [J/m³], E3 [J/m³], Elis [J/m³], PI [J/m³]

Oprava: E1 [J], E2 [J], E3 [J], Elis [J], PI [%]