

Abstrakt

Zhoubné novotvary představují ve většině evropských zemí druhou nejčastější skupinu příčin úmrtí, a stávají se tak významným problémem veřejného zdraví v Evropě. Cílem této práce je analyzovat a porovnat vývoj úmrtnosti na vybrané novotvary od 80. let 20. století do současnosti z regionálního hlediska v Itálii, Švédsku a České republice a na celostátní úrovni také na Slovensku. Hlavní část tvoří analýza intenzity incidence a úmrtnosti na novotvary v závislosti na diferenciaci geografického prostředí a rovněž identifikace územních jednotek se zvýšeným výskytem těchto chorob a faktorů, které mají na této skutečnosti pravděpodobně největší podíl. Od 80. let můžeme u všech zemí pozorovat významný pokles úrovně úmrtnosti obou pohlaví na ZN žaludku. Mírně klesající tendence vykazovaly také intenzity úmrtnosti žen na ZN kolorekta, ZN prsu a ZN dělohy a úmrtnosti mužů na ZN průdušnice, průdušky a plic. Zhoršující se trend byl patrný u úmrtnosti žen na ZN průdušnice, průdušky a plic, u mužů na ZN prostaty a, s výjimkou Itálie, u úmrtnosti na ZN vaječniku.