

## Abstrakt

**Název:** Možnosti funkčního hodnocení stavu pacientů po prodělané akutní cévní mozkové příhodě v ČR

**Cíle:** Hlavním cílem této práce bylo popsat problematiku funkčního hodnocení pacientů po CMP. Dalším cílem bylo zjistit a porovnat vlastnosti nejčastěji používaných funkčních testů určených pro hodnocení pacientů po CMP u nás.

**Metody:** Tato práce je teoreticko – výzkumnou prací, kdy se v teoretické části v době od září 2012 do června 2013 při vyhledávání dat z literárních zdrojů postupovalo cíleně za pomoci klíčových slov a jejich kombinací v databázích založených na EBM. Praktickou část tvořila dotazníková studie, kdy byla za pomoci dotazníkové studie získávána data potřebná pro hodnocení klinické vhodnosti, a to v době od května 2013 do července 2013. Po získání potřebných dat z teoretické i praktické části byla tato data ohodnocena a analyzována dle standardní metodiky pro hodnocení funkčních testů pro spinální pacienty (Chapman, et al, 2007) a výsledky jednotlivých testů byly vzájemně konfrontovány.

**Výsledky:** V teoretické části jsme z dostupných zdrojů zjistili vysokou objektivitu všech tří hodnocených testů, kdy test Barthel index a Funkční test soběstačnosti získaly nejvyšší možný výsledek a modifikovaný Rankinův test měl drobné nedostatky. V praktické části jsme mohli po zhodnocení získaných dat potvrdit obě předem stanovené hypotézy, a to, že čím podrobnější a rozsáhlejší test je, tím se snižuje jeho klinická vhodnost, která je určena uživatelskou a klientskou přívětivostí.

**Klíčová slova:** CMP, funkční testování, hodnocení, Barthel Index, modifikovaný Rankin test, Test funkční soběstačnosti