

Tato práce se zabývá současnou (r. 2005) úlohou tamoxifenu v hormonální terapii karcinomu prsu v podmínkách České republiky. Účelem této práce je zhodnotit užitečnost resp. vhodnost podání tamoxifenu jako léku první volby v situaci, kdy jsou k dispozici další preparáty pro hormonální terapii.

#### Projekt

Analýza terapie tamoxifenem u pacientek s karcinomem prsu (s diagnózou C50), zařazených do databáze onkologické kliniky FNKV (Fakultní nemocnice Královské Vinohrady) v roce 1998, 1999 a 2000.

#### Pacientky

Celkem bylo sledováno 736 pacientek s diagnózou C50, ze kterých byl na základě daných kritérií vybrán a dále analyzován konečný soubor čítající 243 pacientek.

#### Hlavní sledované parametry a výsledky

Jedním z hlavních cílů bylo určit podíl pacientek, které užívaly tamoxifen po celou doporučenou dobu tj. minimálně 5 let, aniž by se u nich objevila komplikace, která by vedla k předčasnému ukončení terapie. Tento podíl představoval 45,7% z 243 pacientek.

Dále byly sledovány pacientky, u kterých byla původní terapie tamoxifenem nahrazena tzv. modernějšími léky (inhibitory aromatáz, čisté antiestrogeny). Důvodem byly závažné nežádoucí účinky tamoxifenu či recidiva onemocnění. Tyto pacientky tvořily 44,0% z 243 pacientek.

Taktéž byly evidovány a následně procentuálně vyjádřeny jednotlivé komplikace, které se objevily během léčby tamoxifenem.