

## Hodnocení bakalářské práce

Téma: Kvalita života pacientů s idiopatickými střevními záněty

Autor: Martina Vondroušová

Studijní obor: Ošetrovatelství – pedagogika ve zdravotnictví

Konzultant práce: prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc.

### Vlastní hodnocení:

Vybrané téma je zajímavé zaměřením na problematiku kvality života u skupiny nemocných s jasně definovaným onemocněním. Zpracování je velmi důkladné po formální i obsahové stránce, jak v části teoretické tak empirické. Mimořádné je i grafické provedení a část věnovaná přílohám a literatuře.

Jediná výtka by mohla směřovat k odstavci *Psychogeneze* v kapitole věnované *Etiologii a patogenezi*. Dle autorky „jako primární etiologie se však dnes psychogeneze neuplatňuje“. Tato formulace může spíše svědčit o tom, že pozornost výzkumníků jeán zaměřena pouze na biologickou úroveň nebo o převažujícím chápání jednoduché lineární kauzality, nikoli o dostatečném poznání složité provázanosti a vzájemném ovlivnění v bio-psycho-sociálním smyslu. O tom, že postoj k problematice může být různý, svědčí citace z [www.pubmed.gov](http://www.pubmed.gov). v poznámce níže uvedené.

Byť v dotazníku se autorka snaží postihnout biopsychosociální perspektivu, bylo by zajímavé se zaměřit i na to, jak onemocnění člověka vnímá jeho rodina, jak je tzv.rodinná dynamika ovlivněna chronickým onemocněním.

### Klasifikace: Výborně

Datum: 24.5.2006

MUDr. D.Skorunka

Ústav sociálního lékařství  
Lékařská fakulta, Univerzita Karlova

Pozn:

Z Gastroenterol. 1996 Oct;34(10):708-13.

### **Psychosocial factors in Crohn disease—an overview**

Enck P, Schafer R.

Klinik für Gastroenterologie und Infektiologie, Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf.

In more than 50 years of psychosomatic research on Crohn's disease, several research hypotheses have been generated, which are critically reviewed here: A disease-specific personality could never be identified, and an important role of psychiatric and psychopathologic personality traits in disease onset was never substantiated. Moreover, most abnormalities found in psychological tests have to be regarded as secondary to chronic illness. Effects of psychologic and social stress on symptoms have not been validated, but it may be that Crohn's patients may have developed less coping abilities with daily hassles. Psychotherapy may improve this, but does not affect the clinical course of the disease.

Surg Clin North Am. 2001 Feb;81(1):231-52, x.

### **Psychosocial aspects of Crohn's disease.**

Ringel Y, Drossman DA.

Functional Gastrointestinal and Motility Disorders Center, University of North Carolina School of Medicine, Chapel Hill 27599-7080, USA.

In clinical practice, significant discrepancies occur between disease activity and severity, and the patient's symptom experience and behavior. Discrepancies cannot be explained by biologic or morphologic findings, and usually are considered to be related to psychosocial factors. Recent advances in the scientific understanding of the relationship between environmental stress and the neural, endocrine, and immune systems, combined with new methodologies in clinical research, provide a challenging opportunity for clinicians and researchers to establish a more comprehensive understanding of Crohn's disease. This article reviews the important relationship of psychosocial factors, pathogenesis, clinical expression, response to treatment, and outcome of Crohn's disease, and presents a comprehensive model of illness, disease, and ways to integrate psychosocial factors with diagnosis and patient care.