

Převládající způsob očisty celého těla dítěte	denně nebo téměř denně				2 – 6× týdně				1× týdně a méně často			
	1. rok	2. – 3. rok	4. – 5. rok	6. až dosud	1. rok	2. – 3. rok	4. – 5. rok	6. až dosud	1. rok	2. – 3. rok	4. – 5. rok	6. až dosud
koupání ve vaničce nebo vaně												
sprchování												
omytí těla pomocí umyvadla a žínky												

Dětská kosmetika (krémy, oleje, zásypy) používaná na kůži dítěte	denně nebo téměř denně				1 – 6× týdně				nepravidelně, např. při opruzení			
	1. rok	2. – 3. rok	4. – 5. rok	6. až dosud	1. rok	2. – 3. rok	4. – 5. rok	6. až dosud	1. rok	2. – 3. rok	4. – 5. rok	6. až dosud
obličej												
zadeček												
ostatní tělo												

V jakém věku nastoupilo dítě do:	věk - roky								
	0-1	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9
jeslí									
školky									
školy									

Děti, (nejen sourozenci) které žily trvale ve vaší domácnosti během prvních 2 let života sledovaného dítěte:	počet				
	0	1	2	3	více
děti starší					
děti mladší					

Onemocnění doprovázená horečkou

Jde o nemoci, při nichž má dítě alespoň 2 dny horečku dosahující více než 38,5°C, většinou se tlumí léky nebo zábaly.

Horečnatá onemocnění (teplota nad 38,5°C): vyberte nejčastější situaci	1. rok	2. – 3. rok	4. – 5. rok	6. až dosud
ani jednou za rok				
jednou ročně				
2-4 × ročně				
častěji				
nemohu určit, nevím				

Užívání antibiotik dítětem

Antibiotika jsou léky určené k léčbě infekčních chorob, jejichž užívání má oproti jiným lékům své odlišnosti, např. je nutné je užívat v přesných časových intervalech a balení doporučují lékaři obvykle vždy vybrat celé.

Lékař nebo lékárník na tuto skutečnost většinou upozorní, stejně jako na možné vedlejší účinky, ke kterým mohou patřit zažívací obtíže. Antibiotika se vedle tablet a kapslí vyrábějí i ve formě sirupů, což usnadňuje jejich podávání mladším dětem. Antibiotických preparátů existuje na našem trhu velmi mnoho, k nejčastěji používaným patří:

Amoclen, Amoksiklav, Ampicilin, Augmentin, Azitromycin, Biseptol, Duomox, Klacid, Klaritromycin, Oспен, Penclen, Penicilin, Rulid, Septrin, Sumamed, Unasyn, Zinat.

Užívání antibiotik – jedna kúra, tj. zpravidla 5 – 10 dnů:	1. rok	2. – 3. rok	4. – 5. rok	6. až dosud
ani jednou za rok				
jednou ročně				
2-4 × ročně				
častěji				

Opakování onemocnění se zvýšenou teplotou (nachlazení, rýma, kašel atd.) – vyberte nejčastější situaci:	1. rok	2. – 3. rok	4. – 5. rok	6. až dosud
po uzdravení později než za 3 měsíce				
po uzdravení za 1 – 3 měsíce				
po uzdravení i dříve než 1 měsíc				