

Výživa matky v těhotenství - uveďte (porovnejte), v jakém množství jste konzumovala **multivitaminové přípravky (Calibrium, Elasti-Q, Elevit, GS Mamavit, Centrum, CEM-M, Multi-Tabs, Cesium, Energit, MedPharma)** během těhotenství a během kojení tohoto dítěte. Zaškrtněte kolonku, která u každého výrobku nejlépe vystihuje Vaši situaci (uvedené množství je součet za celé tři měsíce). Pokud jste nekojila, vyplňte údaje jen o době těhotenství.

Užívání multivitaminů během jednotlivých třetin těhotenství, při němž jste čekala toto dítě a během kojení	v 1. – 3. měsíci	ve 4. – 6. měsíci	v 7. – 9. měsíci	během kojení
1 – 30 tablet nebo tobolek				
31 – 90 tablet nebo tobolek				
multivitaminy jsem neužívala vůbec				

Léky v těhotenství – zkuste si vzpomenout, zda jste v těhotenství užívala nějaké léky tak, že jste spotřebovala alespoň jednu krabičku – balení. Jde především o antibiotika, což jsou léky určené k léčbě infekčních chorob, jejichž užívání má oproti jiným lékům své odlišnosti, např. je nutné je užívat v přesných časových intervalech a balení doporučují lékaři obvykle vždy vybrat celé. Lékař nebo lékárník na tuto skutečnost většinou upozorní. Antibiotických preparátů existuje na našem trhu velmi mnoho, k nejčastěji používaným patří: **Amoclen, Amoksiklav, Ampicilin, Augmentin, Azitromycin Biseptol, Duomox, Klacid, Klaritromycin, Ospen, Penicilin, Penclen, Rulid, Septrin, Sumamed, Unasyn, Zinat.**

Uveďte (vypište), prosíme, další léky, které jste užívala během jednotlivých třetin těhotenství, jde např. o léky proti alergii, astmatu, nevolnosti, pálení žáhy	v 1. – 3. měsíci	ve 4. – 6. měsíci	v 7. – 9. měsíci	během kojení

Zajímají nás i léky používané proti hořečce a bolesti, které obsahují paracetamol, mezi něž patří: **Acifein, Ataralgin, Calpol, Coldrex, Efferalgin, Korylan, Mexalen, Mexavit, Panadol, Paracetamol, Paralen, Tomapyrin.**

Užívání výše uvedených léků během jednotlivých třetin těhotenství. Odhadněte množství za celé 3 měsíce. (Jedno balení (krabička, obsahuje zpravidla 10 tablet či tobolek)	v 1. – 3. měsíci	ve 4. – 6. měsíci	v 7. – 9. měsíci	během kojení
žádný z těchto léků				
méně než jedno balení				
2-4 balení				
více než 5 balení				
nevím, nevzpomínám si				

Užívání antibiotik během jednotlivých třetin těhotenství, při němž jste čekala toto dítě (Jedna kúra, znamená užívání zpravidla 3 – 10 dnů)	v 1. – 3. měsíci	ve 4. – 6. měsíci	v 7. – 9. měsíci	během kojení
žádná kúra				
jedna kúra				
2-4 kúry				
více kúr (déle než 20 dnů celkem)				
nevím, nevzpomínám si				

Uveďte Vaši převládající náladu během těhotenství a po porodu – pozor, místo na dobu kojení se ptáme na šestinedělí	v 1. – 3. měsíci	ve 4. – 6. měsíci	v 7. – 9. měsíci	během šestinedělí
pohoda, klid, radost				
převážně klid, bez problémů				
občas problémy				
problémy, napětí				
velké problémy, stres				
nevím, nedokážu posoudit				