


4) Které z uvedených prostředků, vám při správném použití zajistí vysokou míru ochrany před kapavkovou infekcí?(více možností) :

- A) kondom
- B) spermicidní gel/krém
- C) hormonální antikoncepce
- D) nitroděložní tělísko
- E) lubrikační gel

U otázky č.: 4 mohli studenti zvolit více možností, jedinou správnou odpovědí však byla varianta A) **kondom**, kterou označilo 15 studentů (100%) oboru KS a 13 studentů (87%) oboru MSR. Nejčastěji označenými chybnými variantami byly možnosti C) **nitroděložní tělísko**, kterou zvolil 1 student (7%) oboru MSR a D) **hormonální antikoncepce**, kterou rovněž zvolil 1 student (7%) oboru MSR. V celkovém počtu tedy správně odpovědělo 28 studentů (93%) a současně 1 student (3%) zvolil chybně C) **nitroděložní tělísko** a 1 student (3%) D) **hormonální antikoncepce**.




Graf 1 zobrazuje procentuální počty odpovědí studentů na otázku č. 4)

9) Který z uvedených prostředků, vám při správném použití zajistí vysokou míru ochrany před syfilitickou infekcí?(více možností) :

- A) kondom
- B) spermicidní gel/krém
- C) hormonální antikoncepce
- D) nitroděložní tělísko
- E) lubrikační gel

U otázky č.: 9 mohli studenti zvolit více možností, jedinou správnou odpovědí však byla varianta **A) kondom**, kterou zvolilo 15 studentů (100%) oboru KS a 6 studentů (40%) oboru MSR. Dále volili chybné varianty pouze studenti oboru MSR, nejčastěji variantu **B) spermicidní gel/krém**, kterou zvolili 4 studenti (27%) V celkovém počtu tedy správně odpovědělo 21 studentů (70%)



Graf 2 zobrazuje procentuální počty odpovědí studentů na otázku č. 9)