

Nosní polypóza, jakkoliv se jedná o benigní onemocnění, představuje významný medicínský problém, a to zejména nepříjemným subjektivním vnímáním onemocnění pacientem a také četností recidiv tohoto onemocnění, jejichž sledováním jsme se v předkládané práci zabývali. Existuje celá řada různých definic onemocnění, obecně uznávaný konsensus specialistů, zabývajících se nosní polypózou charakterizuje nosní polypy jako edematózní slizniční výchlípky, které se mohou vyskytovat v různém rozsahu od jednoho polypu až po difúzní polypózu, a které kromě dutiny nosní mohou postihovat také paranasální dutiny. Etiologie nosní polypózy je komplexní otázkou, obecně však lze říci, že nosní polypy jsou konečným stádiem zánětlivého procesu různého původu. Tento zánětlivý proces je často neomezen na nosní sliznici a sliznici paranasálních dutin – nosní polypóza je nezřídka součástí jiných onemocnění, jako jsou např. cystická fibróza. (tab.1)

Jak bylo uvedeno výše, nosní polypóza je onemocnění s relativně vysokým počtem recidiv i po radikální – chirurgické – léčbě. I po úspěšném „vyléčení“ nosní polypózy kombinací léčebných metod s předpokládaným aditivním efektem se nedaří zabránit recidivě u všech nemocných.

V předkládané práci jsme se snažili v základech popsat epidemiologii nosní polypózy (rozdíl výskytu tohoto onemocnění v závislosti na věku, pohlaví, popsat rozdílnou distribuci nosní polypózy podle klasifikace dle Stammbergera,...) a především sledovat četnost recidivy onemocnění. Zmiňované parametry jsme sledovali v souboru 96ti pacientů s nosní polypózou chirurgicky ošetřených na Otorhinolaryngologické klinice Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a 3.Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze v r.2004.