



Grafy znázorňující změnu podílu hmotnosti sušiny na celkové hmotnosti vzorku u ošetřených rostlin ve srovnání s kontrolou, experiment ČIROK X

KT	kontrolní teplota (25 °C den / 20 °C noc)
VOT	vyšší otužovací teplota (13 °C den / 8 °C)
NOT	nižší otužovací teplota (9 °C den / 6 °C noc)
VST	vyšší stresová teplota (8 °C den / 5 °C noc)
NST	nižší stresová teplota (3,5 °C den / 2 °C)


Tabulka č. 1: Seznam zkratk využitých v grafech a jejich popisu



Graf č. 1: Vliv otužovací teploty na podíl hmotnosti sušiny na celkové hmotnosti vzorku listů a stonků rostlin čiroku. Genotyp „Ruzrok“, experiment ČIROK X. Jednotlivé varianty ošetření rostlin: KT – 2 dny; VOT - 4 dny. Před ošetřením byly rostliny pěstovány 17 dní při KT. Chybové úsečky znázorňují směrodatnou odchylku podílu hmotnosti sušiny na celkové hmotnosti vzorku. Různá písmena nad sloupci značí statisticky významný rozdíl v podílu hmotnosti sušiny na celkové hmotnosti vzorku na hladině významnosti $\alpha = 0,05$; One-Way ANOVA; $n = 6$.




Graf č. 2: Vliv otužovací teploty na podíl hmotnosti sušiny na celkové hmotnosti vzorku listů a stonků rostlin čiroku. Genotyp „01Z1800012“, experiment ČIROK X. Jednotlivé varianty ošetření rostlin: KT – 2 dny; VOT - 4 dny. Před ošetřením byly rostliny pěstovány 17 dní při KT. Chybové úsečky znázorňují směrodatnou odchylku podílu hmotnosti sušiny na celkové hmotnosti vzorku. Různá písmena nad sloupci značí statisticky významný rozdíl v podílu hmotnosti sušiny na celkové hmotnosti vzorku na hladině významnosti $\alpha = 0,05$; One-Way ANOVA; $n = 6$.




Graf č. 3: Vliv otužovací a stresové teploty na podíl hmotnosti sušiny na celkové hmotnosti vzorku listů a stonků rostlin čiroku. Genotyp „Ruzrok“, experiment ČIROK X. Jednotlivé varianty ošetření rostlin: KT – 2 dny; V+V: VOT - 4 dny, VST – 1 den. Před ošetřením byly rostliny pěstovány 17 dní při KT.


Chybové úsečky znázorňují směrodatnou odchylku podílu hmotnosti sušiny na celkové hmotnosti vzorku. Různá písmena nad sloupci značí statisticky významný rozdíl v podílu hmotnosti sušiny na celkové hmotnosti vzorku na hladině významnosti $\alpha = 0,05$; One-Way ANOVA; $n = 6$.



Graf č. 4: Vliv otužovací a stresové teploty na podíl hmotnosti sušiny na celkové hmotnosti vzorku listů a stonků rostlin čiroku. Genotyp „01Z1800012“, experiment ČIROK X. Jednotlivé varianty ošetření rostlin: **KT** – 2 dny; **V+V**: VOT - 4 dny, **VST** – 1 den. Před ošetřením byly rostliny pěstovány 17 dní při **KT**. Chybové úsečky znázorňují směrodatnou odchylku podílu hmotnosti sušiny na celkové hmotnosti vzorku. Různá písmena nad sloupci značí statisticky významný rozdíl v podílu hmotnosti sušiny na celkové hmotnosti vzorku na hladině významnosti $\alpha = 0,05$; One-Way ANOVA; $n = 6$.




Graf č. 5: Vliv otužovací a stresové teploty na podíl hmotnosti sušiny na celkové hmotnosti vzorku listů a stonků rostlin čiroku. Genotyp „Ruzrok“, experiment ČIROK X. Jednotlivé varianty ošetření rostlin: KT – 3 dny; V+V: VOT - 4 dny, VST – 4 dny. Před ošetřením byly rostliny pěstovány 17 dní při KT. Chybové úsečky znázorňují směrodatnou odchylku podílu hmotnosti sušiny na celkové hmotnosti vzorku. Různá písmena nad sloupci značí statisticky významný rozdíl v podílu hmotnosti sušiny na celkové hmotnosti vzorku na hladině významnosti $\alpha = 0,05$; One-Way ANOVA; $n = 6$.




Graf č. 6: Vliv otužovací a stresové teploty na podíl hmotnosti sušiny na celkové hmotnosti vzorku listů a stonků rostlin čiroku. Genotyp „01Z1800012“, experiment ČIROK X. Jednotlivé varianty ošetření rostlin: KT – 3 dny; V+V: VOT - 4 dny, VST – 4 dny. Před ošetřením byly rostliny pěstovány 17 dní při KT.


Chybové úsečky znázorňují směrodatnou odchylku podílu hmotnosti sušiny na celkové hmotnosti vzorku. Různá písmena nad sloupci značí statisticky významný rozdíl v podílu hmotnosti sušiny na celkové hmotnosti vzorku na hladině významnosti $\alpha = 0,05$; One-Way ANOVA; $n = 6$.



Graf č. 7: Vliv otužovací a stresové teploty na podíl hmotnosti sušiny na celkové hmotnosti vzorku listů a stonků rostlin čiroku. Genotyp „Ruzrok“, experiment ČIROK X. Jednotlivé varianty ošetření rostlin: KT – 4 dny; V+V: VOT - 4 dny, VST – 4 dny, KT – 1 den. Před ošetřením byly rostliny pěstovány 17 dní při KT. Chybové úsečky znázorňují směrodatnou odchylku podílu hmotnosti sušiny na celkové hmotnosti vzorku. Různá písmena nad sloupci značí statisticky významný rozdíl v podílu hmotnosti sušiny na celkové hmotnosti vzorku na hladině významnosti $\alpha = 0,05$; One-Way ANOVA; $n = 6$.




Graf č. 8: Vliv otužovací a stresové teploty na podíl hmotnosti sušiny na celkové hmotnosti vzorku listů a stonků rostlin čiroku. Genotyp „01Z1800012“, experiment ČIROK X. Jednotlivé varianty ošetření rostlin: KT – 4 dny; V+V: VOT - 4 dny, VST – 4 dny, KT – 1 den. Před ošetřením byly rostliny pěstovány 17 dní při KT. Chybové úsečky znázorňují směrodatnou odchylku podílu hmotnosti sušiny na celkové hmotnosti vzorku. Různá písmena nad sloupci značí statisticky významný rozdíl v podílu hmotnosti sušiny na celkové hmotnosti vzorku na hladině významnosti $\alpha = 0,05$; One-Way ANOVA; $n = 6$.




Graf č. 9: Vliv otužovací a stresové teploty na podíl hmotnosti sušiny na celkové hmotnosti vzorku listů a stonků rostlin čiroku. Genotyp „Ruzrok“, experiment ČIROK X. Jednotlivé varianty ošetření rostlin: KT – 7 dnů; V+V: VOT - 4 dny, VST – 4 dny, KT – 4 dny. Před ošetřením byly rostliny pěstovány 17 dní


při KT. Chybové úsečky znázorňují směrodatnou odchylku podílu hmotnosti sušiny na celkové hmotnosti vzorku. Různá písmena nad sloupci značí statisticky významný rozdíl v podílu hmotnosti sušiny na celkové hmotnosti vzorku na hladině významnosti $\alpha = 0,05$; One-Way ANOVA; $n = 6$.



Graf č. 10: Vliv otužovací a stresové teploty na podíl hmotnosti sušiny na celkové hmotnosti vzorku listů a stonků rostlin čiroku. Genotyp „01Z1800012“, experiment ČIROK X. Jednotlivé varianty ošetření rostlin: **KT** – 7 dnů; **V+V**: VOT - 4 dny, VST – 4 dny, KT – 4 dny. Před ošetřením byly rostliny pěstovány 17 dní při KT. Chybové úsečky znázorňují směrodatnou odchylku podílu hmotnosti sušiny na celkové hmotnosti vzorku. Různá písmena nad sloupci značí statisticky významný rozdíl v podílu hmotnosti sušiny na celkové hmotnosti vzorku na hladině významnosti $\alpha = 0,05$; One-Way ANOVA; $n = 6$.



Graf č. 11: Vliv stresové teploty na podíl hmotnosti sušiny na celkové hmotnosti vzorku listů a stonků rostlin čiroku. Genotyp „Ruzrok“, experiment ČIROK X. Jednotlivé varianty ošetření rostlin: **KT** – 0 dnů; **VST** – 1 den. Před ošetřením byly rostliny pěstovány 21 dní při KT. Chybové úsečky znázorňují směrodatnou odchylku podílu hmotnosti sušiny na celkové hmotnosti vzorku. Různá písmena nad sloupci značí statisticky významný rozdíl v podílu hmotnosti sušiny na celkové hmotnosti vzorku na hladině významnosti $\alpha = 0,05$; One-Way ANOVA; $n = 6$.



Graf č. 12: Vliv stresové teploty na podíl hmotnosti sušiny na celkové hmotnosti vzorku listů a stonků rostlin čiroku. Genotyp „01Z1800012“, experiment ČIROK X. Jednotlivé varianty ošetření rostlin: **KT** – 0 dnů; **VST** – 1 den. Před ošetřením byly rostliny pěstovány 21 dní při KT. Chybové úsečky znázorňují

směrodatnou odchylku podílu hmotnosti sušiny na celkové hmotnosti vzorku. Různá písmena nad sloupci značí statisticky významný rozdíl v podílu hmotnosti sušiny na celkové hmotnosti vzorku na hladině významnosti $\alpha = 0,05$; One-Way ANOVA; $n = 6$.