

Záměrem bakalářské bylo na základě průzkumného šetření zjistit, zda se potřeby pacientů s CHOPN mění v závislosti na stadiu onemocnění.

Práce je rozdělená na teoretickou a empirickou část. Teoretická část je rozdělená do tří kapitol. První se zabývá charakteristikou CHOPN, její diagnostikou a následnou léčbou. Druhá pojednává o klasifikaci potřeb, motivech a důsledcích, které plynou pro pacienty z nedostatečného uspokojení potřeb. Třetí část se zaměřuje na specifika ošetřování pacientů s CHOPN. V empirické části jsou prezentovány výsledky kvantitativního průzkumu, který probíhal pomocí dotazníkového šetření. Dotazníky byly distribuovány hospitalizovaným pacientům s chronickou obstrukční plicní chorobou ve stadiu II, III a IV na Pneumologické klinice 2. LF UK a FN Motol. Průzkumné šetření probíhalo anonymně, od července do prosince 2017. Celkem bylo osloveno 76 pacientů, z nichž se šetření tři zúčastnit nechtěli.

Z průzkumného šetření vyplynulo, že pacienti ve II. stadiu mají odlišně stanovené potřeby, než pacienti ve stadiu III a IV. U respondentů ve II. stadiu byla zjištěna na prvním místě potřeba lásky, 100% z nich ji uvedlo jako potřebu důležitou. U pacientů ve III. stadiu jsou na prvním místě zachovány fyziologické potřeby, potřebu kyslíku uvedlo 100% respondentů, dále byly jako důležité stanoveny potřeby bezpečí. U IV. stadia pacienti na první místo uvedli potřebu kyslíku (celkem 100%), na druhé a třetí místo opět potřebu bezpečí. 77% nemocných uvedlo, že je pro ně důležité být materiálně zabezpečen.

Získaná data byla zpracována pomocí tabelárních přehledů a grafického výstupu. Výsledky této práce mají přinést pohled na to, jak se jednotlivé potřeby mohou během onemocnění změnit. Mohou tak posloužit zdravotnickému personálu při sestavování cílů ošetrovatelské péče a pro snazší komunikaci s nemocným.