

Abstrakt:

Východiska: V České Republice je odhadem 46,8 tisíc problémových uživatelů drog a prevalence infekčních nemocí (především virové hepatitidy C) mezi problémovými uživateli je vysoká. To může souviset nejen se samotným užíváním drog, ale také s jejich rizikovým sexuálním chováním, skrze které se infekční nemoci mohou přenášet také.

Cíl: Hlavním cílem této práce je popsat výskyt rizikového sexuálního chování u problémových uživatelů návykových látek využívajících nízkoprahové adiktologické služby v Českých Budějovicích.

Metody: Výsledky práce byly zpracovány na základě odpovědí z anonymního dotazníku od 50 klientů kontaktního centra v Českých Budějovicích, celkem se tedy zúčastnilo 12 % klientů kontaktního centra. Byli osloveni ti respondenti, kteří přišli využít výměnný program nebo kontaktní místnost. Výzkumu se zúčastnilo celkem 19 žen a 31 mužů, průměrný věk respondentů činí 32 let. Výsledky výzkumu byly zjištěny a zpracovány do grafů prostřednictvím popisné statistiky. Data byla vyhodnocována v programu Microsoft Excel a následně v programu Microsoft Word.

Výsledky: Z výsledků jsou patrné jisté souvislosti mezi problémovým užíváním návykových látek a rizikovým sexuálním chováním. Respondenti, kteří se někdy chovali sexuálně rizikově, tak většinou učinili pod vlivem návykové látky (88 % respondentů), přičemž nejčastěji uváděli kombinaci alkoholu s jinou nelegální návykovou látkou (64 %), převážně pervitinem a konopnými drogami. Celkem 31 % respondentů uvedlo jako příčinu svého následného rizikového sexuálního chování právě intoxikaci návykovou látkou.

Tato práce rozšířila obzory ohledně rizikového sexuálního chování v souvislosti s problémovým užíváním návykových látek a je možné se díky ní zaměřit na další intervence ohledně této problematiky.