

ABSTRAKT

KVALITA ŽIVOTA U EPILEPSIE

Student: Zývalová Aneta

Vedoucí diplomové práce: Vlček J.

Konzultant: Tlustá E.

Katedra sociální a klinické farmacie, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova v Praze, Česká republika

Úvod: Cílem komplexní protizáchvatové léčby by mělo být zlepšení kvality života, nikoliv pouze potlačování záchvatů.

Cíl: Zhodnotit úroveň kvality života u pacientů s epilepsií a faktory, které ji ovlivňují.

Metodika: Pacientům s diagnózou epilepsie docházejícím do Centra pro epilepsii a epileptochirurgii Fakultní Thomayerovy nemocnice v Praze byl rozdáván dotazník QOLIE-31. V období 2005-2006 dotazník vyplnilo 58 pacientů. Klinické a demografické údaje jsme získali ze zdravotnické dokumentace (41 pacientů).

Výsledky: Průměrný věk pacientů byl 37 let; 66,7 % bylo žen. Z hlediska pracovního zařazení byla nejpočetnější skupina pracujících a studujících (26 pacientů), dále s částečným či plným invalidním důchodem (11 pacientů). Více než 12 záchvatů za rok mělo 19 pacientů, 15 pacientů bylo 2 a více let bez záchvatů. 1. U oblastí QOL „Seizure Worry“, „Social Function“ a „Overall Score“ měli úplně či částečně kompenzovaní pacienti významně kladnější hodnocení ($p < 0,05$). 2. Pohlaví pacientů nemělo statisticky významný vliv na kvalitu života. 3. S narůstajícím věkem měli pacienti klesající QOL, zároveň se však snižovaly obavy ze záchvatů. 4. Pacienti v částečném nebo plném invalidním důchodu měli signifikantní nárůst vyčerpanosti. 5. S nárůstem počtu užívaných antiepileptik byla zhoršující se kvalita života. 6. V mezinárodním srovnání měli pacienti v ČR lepší kvalitu života než pacienti v Maďarsku, Thajsku a U.S.A.

Závěr: Faktory, které nejvíce ovlivňovaly kvalitu života pacientů zahrnovaly věk, frekvenci záchvatů, počet užívaných antiepileptik a pracovní zařazení. V porovnání se studii z dalších zemí dosahovali pacienti v naší studii vyšší skóre QOLIE-31.