

Abstrakt

Diplomová práce se zabývá gender dysforií (GD) u osob s poruchou autistického spektra (PAS). Ke zkoumání této problematiky byl zvolen kvantitativní výzkum, jehož hlavním cílem bylo zjistit, zdali u jedinců s PAS s mírnou symptomatikou dochází k vyššímu výskytu GD či k vyšší míře GD v porovnání s neurotypickou populací (bez autismu; NT). Hlavní metody použité v tomto výzkumu byly: dotazník Autistického kvocientu (AQ-10) a Dotazník Gender Identity/Gender dysforie u adolescentů a dospělých (GIDYQ-AA), díky němuž bylo možné zjistit míru GD a potenciální výskyt diagnózy genderové inkongruence (GI; dle MKN-11).

Výzkumný soubor tvořilo 196 respondentů ve věku 16–74 let. Ve skupině PAS bylo 90 osob a srovnávací skupina běžné populace (NT) čítala 106 jedinců. Zatímco v NT skupině nikdo neuvedl transgender identitu, v PAS skupině 2,2 % respondentů sdělilo, že jsou transgender, a 14,4 % osob si nebylo jisto transgender identitou. Na základě výsledků GIDYQ-AA 4,4 % lidí s PAS dosahovalo nízkého skóru značící možnou přítomnost diagnózy GD (GI). Výzkum zjistil, že ženy s PAS měly signifikantně větší míru GD než ženy v běžné populaci i než muži s PAS. Celkově respondenti s PAS dosahovali statisticky významně menšího skóru v GIDYQ-AA i ve všech jeho subškálách než běžná populace. Dále se zjistil negativní vztah mezi výsledkem AQ-10 a GIDYQ-AA, tj. čím vyšší hodnota v AQ-10, tím menší skór v GIDYQ-AA, jenž značí vyšší míru GD.

Na základě výsledků tohoto výzkumu se stanovil závěr, že autismus a míra autistických rysů mají vliv nejen sexualitu, ale i genderovou identitu a s ní související gender dysforii. Budoucí studie by se měly zaměřit na hlubší porozumění této problematice.

Klíčová slova

Gender dysforie, genderová identita, transgender, transsexualismus, porucha autistického spektra, autismus