

Název práce: Studium teplotně indukované fázové separace v kopolymerních roztocích  
Autor: Julie Brülllová

Katedra (ústav): Katedra makromolekulární fyziky  
Vedoucí diplomové práce: RNDr. Lenka Hanyková, Dr.  
e-mail vedoucího: hanykova@kmf.troja.mff.cuni.cz

**Abstrakt:** V predložené práci je studována teplotně indukovaná fázová separace kopolymerního roztoku poly(akrylamidu/*N*-isopropylmethakrylamidu) v deuterované vodě a ve směsích rozdílně deuterované vody a ethanolu a deuterované vody a acetolu. Uvedený jev se na molekulární úrovni podobá fázovému přechodu (kolapsu) v hydrogelech. Ke studiu je použita metoda nuklearní magnetické spektroskopie (NMR). Bylo zjištěno, že s přibývajícím procentuálním podílem akrylamidu v kopolymeru je fázová separace pozvolnější, dochází k ní při vyšších teplotách a kopolymer se separuje jen částečně. Stejný efekt má vysoký podíl ethanolu či acetolu v rozpouštědle. Při průměru vysokém zastoupení akrylamidu či ethanolu a acetolu dochází k fázové separaci v závislosti na složení rozpouštědla. Relaxační experimenty ukázaly, že po fázové separaci zůstává část molekul rozpouštědla vázána na globulární struktury a je omezena ve své pohyblivosti.

**Klíčová slova:** teplotně indukovaná fázová separace, kopolymer poly(akrylamid/*N*-isopropylmethakrylamid), nuklearní magnetická rezonance