

## Resumé

### Strach před, během a po amniocentéze

Téma bakalářské práce „Strach před, během a po amniocentéze“ jsem si vybrala protože je mi blízké. Vystudovala jsem obor porodní asistentka a sama jsem odběr plodové vody podstoupila.

V teoretické části jsem definovala pojem strach dle několika autorů. Dále jsem se snažila dle dostupných odborných publikací popsat amniocentézu, její historii, dělení, techniku, indikace a kontraindikace výkonu. Součástí teoretické části je i kapitola o plodové vodě, příklady vyšetření odebraného vzorku a příklady vrozených vývojových vad, které jsou zjištělné z plodové vody.

V empirické části bylo cílem zmapovat věkovou hranici žen, které podstoupily amniocentézu, zjistit jejich informovanost o výkonu a odkud tyto informace čerpaly. Dále mě zajímaly důvody amniocentézy, konkrétní příčiny strachu těhotných žen spojených s výkonem odběru plodové vody a pocity klientek před, během a po amniocentéze. Poslední otázka v dotazníku byla, zda by výkon podstoupily znovu.

Výzkumem bylo zjištěno, že věková hranice žen podstupujících amniocentézu je nejčastěji mezi 26-30 a 31-35 lety. Převážná většina zkoumaných žen byla o amniocentéze informována a tyto informace získaly hlavně od lékaře a zdravotní sestry či porodní asistentky. Nejčastějším důvodem výkonu byl špatný výsledek biochemického screeningu vrozených vývojových vad. Strach spojený s výkonem byl největší z výsledku testu, poškození dítěte při výkonu a z rizika těhotenské ztráty a to ať už před, během nebo po amniocentéze. K nejčastějším vyjádřením patřily žádné pocity, bušení srdce a nespavost. Osmdesát tři procent klientek by amniocentézu podstoupilo znovu.