

ERRATA k Rigorózní práci Mgr. Martiny Maříkové


- Str. 18 poslední odstavec: Správně věta: Inhibice a snížení vylučování prodlužuje biologický poločas látky, tím dochází ke zvýšení účinku léčiva.
- Str. 19 název tabulky má správně znít: Přehled klinicky důležitých interakcí: substráty, inhibitory a induktory jednotlivých izoforem CYP450 důležitých v metabolismu léčiv u člověka
- Str. 31 druhý odstavec správně věta: Podle délky přednemocničního transportu lze úvodní dávku doplnit 300mg (30ml 1% roztoku) intravenózně.
- Str. 34 kapitola 4.7.4. předposlední věta správně zní: Flekainid – v ČR máme k dispozici v rámci specifického léčebného programu.
- Str. 55: bod hodnocení dokumentace interakce: správně 1 - 5
- Str. 58: v tab. č. 12 je chybně uvedena ve třetím řádku číselná hodnota vyjadřující závažnost LI. Platí 3 namísto uvedené 2. Správně je tabulka:

Závažnost LI	Počet LI	% (143)
1	48	33,56
2	39	27,27
3	22	15,38
4	3	2,09
0	31	21,67

- Str. 59: doplnit tabulku: Počet LI na jednoho pacienta v závislosti na počtu užívaných léků v souboru pacientů JIP

Počet léků	Počet LI na jednoho pacienta
0-5	1,27
6-10	2,96
11-15	3,33
16 a více	7

Graf č. 2 nahradit grafem:



- Str. 60: větu „Počet užívaných léčiv roste s věkem a počtem užívaných léčiv.“ nahradit větou „Počet LI roste s věkem a s počtem užívaných léčiv.“


doplnit věty: Počet pacientů geriatrického oddělení : ve věkové skupině 61-70 let byli dva pacienti, ve skupině 71-80 let jeden pacient a ve skupině 80 a více let bylo 47 pacientů z toho ve věku 80-85 18 pacientů, 86-90 taktéž 18 pacientů a ve věku 91 a více 11 pacientů, přičemž nejstarší pacient byl ve věku 99 let. V souboru pacientů geriatrického oddělení bylo nalezeno 88 potenciálních lékových interakcí.

- Str. č. 61: tab. č. 14 nahradit tabulkou: Počet LI na jednoho pacienta v závislosti na počtu užívaných léků v souboru pacientů geriatry

Počet léků	Počet LI na jednoho pacienta
0-5	1,19
6-10	1,50
11-15	1,77
16 a více	3,57

Graf č. 4 nahradit grafem: Počet LI na jednoho pacienta v závislosti na počtu užívaných léků v souboru pacientů geriatrického oddělení

Počet LI v závislosti na počtu léčiv v souboru pacientů geriatrického oddělení



Komentář: v souboru sledovaných pacientů bylo nejvíce pacientů ve skupině, která užívala 6-10 léčiv, ve skupinách 10-15 léčiv a 16 a více léčiv bylo po třech pacientech. Se vzrůstajícím počtem léčiv a roste počet interakcí. Původně použitý Graf č. 2 je zkreslující, skutečnost lépe vyjadřuje počet LI na jednoho pacienta v závislosti na počtu užívaných léčiv.

- Str.69: ve větě „Třetí nejčastěji identifikovaná interakce v hladině závažnosti ...“ je chybně uvedena hladina závažnosti 5 namísto správné hladiny závažnosti 4.
- Str. 75: citace č. 8 správně: Bonetti, P.O.; Hartmann, K.; Kun, M.; Linhart W.H.; Wieland, T. Potentielle Arzneimittelinteraktionen und Verordnungshäufigkeit vom Medikamenten mit speziellem Instruktionsbedarf bei Spitalaustritt. Schweiz Med Prax. 2000; 89:182-9