

Příloha

Celkový soubor skupin s elongovaným tělem

Prodloužení břišní části:

Polypteriformes, Acipenseriformes, Lepidosteiformes, Amiidae, z Gonorhynchiformes pouze u Gonorhynchidae a u Phractolaemidae, z Osmeriformes pouze Osmeridae – Salangini; Esociformes – Esocidae; Stomiidae – Stomiinae; Aulipiformes – Alepisauridae, Paralepididae; Lampriformes. Lophotidae, Radiicephalidae, Regaliciidae; Beloniformes - Hemiranphidae, Belonidae, Scomberesocidae; Stephanoberyciformes – Cetommimidae, Mirapinnidae, Megalomycteridae; Gastroteiformes – Hypoptychidae, Gasterosteidae, Syngnathidae, Aulostomidae, Fistulariidae, Centriscidae; Synbranchiformes, Perciformes – Alabes, Sphyraenidae, Gempylidae, Trichiuridae, Tetraodontiformes.

Prodloužení ocasní části:

Osteoglossiformes, Albuliformes – Halosauridae, Notacanthidae; Anguilliformes, Saccopharyngiformes, Siluriformes, Gymnotiformes, Ateleopodiformes – Ateleopodidae; Gadiformes - kromě Moridae, která ocasní část prodlouženou nemá a subfamily Gadinae; Ophidiiformes, Batrachoidiformes, Gastroteiformes – Indostomidae; Scopaeiformes – Hoplichthyidae, Cottidae, Comephoridae, Abyssocottidae, Agonidae, Liparidae; Perciformes (tendence u všech, u uvedených výrazná) – subfamily Congrogadinae, family Notograpidae, Opisthognathidae, Cepolidae, Zoarcidae, Stichaeidae, Scytalinidae, Creedidae, Leptoscopidae, Trachinidae, Tripterygiidae, Dactyloscopidae, Clinidae, Isosteidae, Callionymidae, Microdesmidae, Kurtidae, Acanthuridae (někdy uváděno jako Acanthuriformes), Stromateidae, Osphronemidae, Channidae; Pleuronectiformes.

Dvě hřbetní ploutve:

Atheriniformes, Aulopiformes, Batrachoidiformes, Beryciformes, Gadiformes, Gasterosteiformes, Characiformes, Lophiiformes, Mugiliformes, Myctophiformes, Perciformes, (Salmoniformes), Scopaeiformes, Siluriformes, Zeiformes

Ostny:

Albuliformes, Atheriniformes, Beryciformes, Gadiformes, Gasterosteiformes, Lophiiformes, Perciformes, Scopaeiformes, Synbranchiformes, Zeiformes