

## Abstrakt

Leishmanióza je parazitární onemocnění přenášené krevsajíci flebotomy, které se vyskytuje v mnoha oblastech světa. Kromě Ameriky, Afriky a Asie se s ní setkáváme i v Jižní Evropě, především v oblasti Středomoří, kde *L. infantum* působí hlavně viscerální, ojediněle i kožní formu nemoci. Mezi evropská ohniska patří i Balkánský poloostrov, kde po masivním poklesu počtu případů v 50. letech 20. století, díky plošným kampaním za účelem eradikace malárie, počty leishmanióz znovu narůstají. Hlavními přenašeči leishmanií na člověka jsou v této oblasti flebotomové podrodu *Larroussius*, především *P. neglectus*, *P. perfiliewi* a *P. tobbi*. Hlavním rezervoárovým zvířetem je pes domácí, v současné době je také studován epidemiologický význam koček a divokých zvířat (zajíci, šakali, lišky). Nejvíce případů lidských leishmanióz je hlášeno z Albánie a Řecka, kde se můžeme setkat také s druhem *L. tropica* působícím kožní onemocnění. Tato bakalářská práce se zabývá zmapováním výskytu leishmanióz a jejich přenašečů v jednotlivých balkánských zemích.

**Klíčová slova:** leishmanióza, Evropa, Balkán, *L. infantum*, flebotomové