

ERRATA K BAKALÁŘSKÉ PRÁCI

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE – PEDAGOGICKÁ FAKULTA

KATEDRA PEDAGOGIKY

Autor práce: *Radka KOSTKOVÁ*


Název práce: *Znalosti a dovednosti učitelů vybrané základní školy v oblasti poskytování předlékařské první pomoci*

Chyba: Otázka č. 13

Heimlichův manévr se provádí způsobem:

- a) postiženého opakovaně udeříme silně mezi lopatky
- b) uchopíme hlavu postiženého zezadu tak, že dolní čelist držíme prsty po obou stranách.
- c) **Pomalů se snažíme zaklánět hlavu a otevíráme ústa, postiženého obejmeme zezadu kolem pasu, sepneme obě své ruce (jedna v pěst a druhá drží pěst) opakovaně, prudce stiskneme nadbřišek.**

Graf č. 15: Heimlichův manévr se provádí:




Zdroj: Autorka práce, 2017 (vlastní šetření)

Opraveno: Otázka č. 13

Heimlichův manévr se provádí způsobem:

- d) postiženého opakovaně udeříme silně mezi lopatky
- e) uchopíme hlavu postiženého zezadu tak, že dolní čelist držíme prsty po obou stranách.
- f) **Pomalou se snažíme zaklánět hlavu a otevíráme ústa, postiženého obejmeme zezadu kolem pasu, sepneme obě své ruce (jedna v pěst a druhá drží pěst) opakovaně, prudce stiskneme nadbřišek.**

Graf č. 15: Heimlichův manévr se provádí:




Zdroj: Autorka práce, 2017 (vlastní šetření)

Chyba: Otázka č. 24

Postižený, který má epileptický záchvat, potřebuje v rámci předlékařské první pomoci

- nechat ho bez povšimnutí, chránit ostatní osoby v jeho okolí a vyčkat, dokud záchvat přejde sám
- odstranit překážky z jeho blízkosti, aby si neublížil. Po skončení záchvatu uložit postiženého do stabilizované polohy, poté přivolat lékařskou pomoc pevným stiskem bránit záškubům, do úst umístit pevný předmět, snažíme se na postiženého křičet a tím přerušit jeho záchvat.

Graf č. 26: Postižený, který má epileptický záchvat, potřebuje v rámci první pomoci?




Zdroj: Autorka práce, 2017 (vlastní šetření)

Opraveno: Otázka č. 24

Postižený, který má epileptický záchvat, potřebuje v rámci předlékařské první pomoci

- nechat ho bez povšimnutí, chránit ostatní osoby v jeho okolí a vyčkat, dokud záchvat přejde sám
- odstranit překážky z jeho blízkosti, aby si neublížil. Po skončení záchvatu uložit postiženého do stabilizované polohy, poté přivolat lékařskou pomoc pevným stiskem bránit záškubům, do úst umístit pevný předmět, snažíme se na postiženého křičet a tím přerušit jeho záchvat.**
- pevným stiskem bránit záškubům, do úst umístit pevný předmět, snažíme se na postiženého křičet a tím přerušit jeho záchvat

Graf č. 26: Postižený, který má epileptický záchvat, potřebuje v rámci první pomoci?



Zdroj: Autorka práce, 2017 (vlastní šetření)